

ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ. — Μέχρι τοῦδε τὸ ἄσμα τῶν
ων ἀθεωρεῖτο ὡς καθαρὸς μῦθος πλησιάζων εἰς τοὺς τῆς μη-
λογίας. Φαίνεται ἀποδειχθὲν τελευταίως ὅτι ιχθύες τινες
βάλλουσιν ἥχους. Οἱ ἥχοι οὗτοι, καὶ τοι λίαν ἀσθενεῖς,
νανταὶ, ἀναλόγως τοῦ μέρους ἐν ᾧ παράγονται, νὰ προσλα-
σιν ἔντασίν τινα. Εἶναι γνωστὸν, πράγματι, ὅτι τὸ ὄδωμ
δίδει τοὺς ἥχους πολὺ κάλλιον τοῦ ἀέρος.

Φυσιολόγος τις τῆς Κοπεγχάγης, ὁ Κ. Σόρενσεν, ἠδι-
νὰ παρατηρήσῃ εἰς τὴν Νότιον Αμερικὴν ιχθύας τοῦ γένους
σελούρων παράγοντας ἥχους, καὶ περιπλέον, ἡδυνάθη νὰ
διορίσῃ τὴν ἔδραν τῆς παραγωγῆς αὐτῶν, ἐν ἐνὶ λόγῳ
φωνητικὸν ὅργανον τῶν ιχθύων τούτων. Εὗρεν ὅτι ἡδεῖ
τῇ ἀεροδόχῳ κύστει, τούτεστι ἐν τῷ μόνῳ πνεύμονι, ὃν
κτηνται οἱ ιχθύες. Ἡ κύστης αὕτη συνίσταται ἐκ τίνος μη-
ἀεροδόχου θύλακος διὰ τοῦ ὄποιου ὁ ιχθύς ἀνέρχεται ἢ κα-
χεται ἐν τῷ ύγρῳ. Ἀλλὰ ἡ ἀεροδόχος κύστης τῶν ὑπὸ τοῦ
Σόρενσεν παρατηρηθέντων σελούρων εἶναι πολὺ πολυπλοκή
τῆς τῶν ἀρώνων ιχθύων· περιέχει διαφράγματα, μεμβρά-
αῖτινες τὴν διαχωρίζουσιν ἐν εἴδει θεωρείων ἐξωτερικῆς
ρουσιάζεις: σύστημα μυῶν ἴδιατέρων. Κατὰ τὸν Κ. Σόρεν-
σενιουμένων τῶν μυῶν ὁ ἀτῆρ, ἐκδιωκόμενος τοῦ ἐνὸς χωρίος
τος τῆς ἀεροδόχου κύστεως εἰς τὸ ἄλλον, κινεῖ τὰς ἐν τῷ
ταξὶ μεμβράνας καὶ παράγει τοισυτετρόποις τοὺς ἥχους.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.

Ἐπ τῷ III^ο φριλιδίῳ τοῦ Α. ἐποιεὶσθη κατὰ παρ-
τήρα τοῦ καταδόχορ τῶν ἀντεπεπελλότων μελλού τὸ ὄρεη
χ. ΚΥΡΙΑΚΙΑΟΥ. — Άτ. 16 περίπατοι μελίδες τοῦ παράτος τοῦ
ἡμεριδιανού Λαρανδρίου. Άττι 302 αριστοτέλος 393 καὶ
κατ' ἔξοι.