

παρουσιάζουν μίαν ζωηρότητα πλέον ἀ-
δύνατον, παρά τὰ κλήματα τὰ προερχό-
μενα ἀπὸ τὴν συλλογὴν τῆς Pully. Αὐ-
τὴ ἡ παρατήρησις μένει ἔγκυρος διὰ τὰ
τρία τεμάχια, διαρκούσης ὅλης τῆς πε-
ρίοδου τῆς παρατηρήσεως.

Πολὺ ὑψηλὴ ἐν τῷ φυτωρίῳ, ἡ θνη-
σιμότης τῶν κλημάτων, ἔμεινε μικρὰ

διὰ τὸ δεύτερον ἔτος τῆς φυτεύσεως,
ᾧ ὤφειλον ν' ἀντικαταστήσουν μερικὰ
κλημάτα ἀπὸ τότε. Δίδομεν ὡς τίτλον
παραδείγματος εἰς τὸν κατωτέρω πίνα-
κα τὰ ἀποτελέσματα τῶν πραγματο-
ποιηθέντων μέτρων εἰς τὸν δοκιμαστι-
κὸν τοῦ Saint—Prex.

Ὀλικὸν μῆκος εἰς ἑκατοστόμετρα τῶν βλαστῶν κατὰ κλῆμα

Καταγωγὴ τῶν ἐμβολίων (Chasselas)	Porte Grefte	6-10 1949	6-7 1950	21-5 1951	6-6 1952	26-6 1953	16-6 1954
Pully, Sain	3309	87	298	429	360	369	336
La Cote, Degenere	3309	57	219	217	256	272	223
Lavaux, Degenere	3309	67	223	265	297	295	270
Pully, Sain	5 C	76	354	411	392	415	330
La Cote, Degenere	5 C	54	210	263	337	359	297
Lavaux, Degenere	5 C	47	202	318	345	360	312

Αἱ ἄμπελοι κλαδευόμεναι En Gobelet
καὶ καθοδηγούμεναι κατὰ πατροπαράδο-
τον τρόπον, ἡ ὀλικὴ αὐξήσις τῶν βλα-
στῶν μέχρι τοῦ Ὀκτωβρίου δὲν ἠδυνή-
θη νὰ προσδιορισθῇ ἔνεκα τοῦ ἐφαρμο-
ζομένου κατὰ τὸ θέρος κορυφολογήμα-

τος. Αἱ διαφοραὶ ἐξηφανίσθησαν πρὸς
τὸ τέλος τῆς σαιζόν, ἀλλὰ ἐμμένουσιν
εἰς τὴν ζωηρότητα. Τὰ κυμαινόμενα
βάρη τότε τοῦ κλαδεύματος εἰς τὸ τέ-
λος τοῦ χειμῶνος δίδουσι τὴν ἀπόδει-
ξιν.

Μέσον βάρος (εἰς γραμμάρια) τῶν κληματίδων κατὰ κλῆμα.

Δοκιμαὶ εἰς Saint—Prex

Καταγωγὴ τῶν ἐμβολίων (Chasselas)	Porte Grefte	3—3—1950	2—3—1951	14—3—1952
Pully, Sain	3309	14	88	342
La Cote, Degenere	3309	6	54	177
Lavaux, Degenere	3309	7	52	197
Pully, Sain	5 C	10	119	479
La Cote, Degenere	5 C	6	60	314
Lavaux, Degenere	5 C	5	48	226

**Διπλοὶ κόμβοι (γόνατα),
πλατύνσεις**

Δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἐκφράσωμεν ἀ-
ριθμητικῶς ὅλα τὰ συμπτώματα τοῦ

ἐκφυλισμοῦ. Θὰ περιορισθῶμεν ἐδῶ εἰς
μίαν ἐκτίμησιν πολὺ σπουδαίαν μεταξὺ
τούτων: Οἱ διπλοὶ κόμβοι, αἱ πλατύ-
σεις καὶ ἡ ἐγχρωμὸς ἡ ἡ λευκὴ κηλὶς.
Ἀπὸ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς φυτεύσεως,