

πος καὶ εἰς τὰς δύο περιπτώσεις (ύπὸ τὸ πλαστικὸν καὶ ὑπὸ τὸν ἥλιον) ἡ πλάγη ἐπὶ χωματαλώνων, διπλῆς κλίσεως, ἐπεστρωμένων δι' εἰδικοῦ χάρτου ἐπιστρώσεως (ΚΡΑ-FT).

Εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν, οὕτος ἐκαλύψθη καθ' ὅλον τὸν χρόνον τῆς ἀποξηράνσεως μὲν πλαστικὸν σταφιδόπανον ἔξ ἀχρόου, διαφανοῦς πολυαιθυλενίου, τῶν ἴδιων μὲ τὰ κοινὰ σταφιδόπανα διαστάσεων, ἥτοι 9 μ. X 4 μ. καὶ πάχους 0,15 χιλιοστομέτρων. Τοῦτο ἐκάλυψε τὸν ὑπὸ ἀποξήρανσιν σταφιδόκαρπτον ἐν εἴδει δικλινοῦς στέγης, ὕψους εἰς μὲν τὸ μέσον (μαχιᾶς) 0,15 μ. εἰς δὲ τὰ πλάγια (ρονιές) 0,12 μ. ἀπὸ τοῦ ἐδάφους. Τὸ ὕψος τοῦ σταφιδοπάνου ὠρίσαμεν αὐθαιρέτως, ὡδηγη-

θέντες ἀπὸ τὴν χρησιμοποίησιν τῶν κοινῶν σταφιδοπάνων.

Ἡ ἀποξηράνσης ἡρχισε τὴν 17) 8)56 ὑπὸ τὸν ἥλιον καὶ τὴν 18)8)56 ὑπὸ τὸ πλαστικὸν σταφιδόπανον καὶ ἐπερατώθη ταύτοχρόνως τὴν 30)8)56, παρουσιάσασα μίαν ἡμέραν διαφοράν ὑπέρ τοῦ πλαστικοῦ.

Αἱ ἐπικρατήσασαι καιρικαὶ συνθῆκαι κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἀποξηράνσεως, ἥσαν εὐνοϊκαὶ δι' αὐτὴν (καιρὸς αἱθρίος καὶ θερμός), ὁ δὲ σταφιδόκαρπος οὐδὲν ἵχνος εὑρωτιάσεως παρουσίασε τόσον ὑπὸ τὸ σταφιδόπανον ὅσον καὶ ὑπὸ τὸν ἥλιον. Αἱ σημειωθεῖσαι θερμοκρασίαι, κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ πειράματος, ἐπὶ τοῦ ὑπὸ ἀποξήρανσιν σταφιδοκάρπου, ὑπὸ τὸ σταφιδόπανον καὶ ὑπὸ τὸν ἥλιον, δίδονται ὑπὸ τοῦ κατωτέρω πίνακος I :

Π Ι Ν Α Ε Ι

Σημειωθεῖσαι θερμοκρασίαι ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ὑπὸ ἀποξήρανσιν σταφιδοκάρπου ὑπὸ τὸν ἥλιον καὶ ὑπὸ τὸ πλαστικὸν σταφιδόπανον

Χρονολογία	ΩΡΑΙ ΛΗΨΕΩΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ									
	Ὑπὸ πλαστικὸν σταφιδόπανον					Ὑπὸ τὸν ἥλιον				
	6	10	14	18	Σύνολον	6	10	14	18	Σύνολον
22-8-56	17	46	49	35	147	17	47	42	34	140
23-8-56	19	45	47	35	146	17	40	43	33	133
24-8-56	27	41	37	28	133	16	34	37	28	115
25-8-56	18	38	47	34	137	16	40	41	33	130
26-8-56	16	39	44	33	132	14	41	39	31	125
27-8-56	17	45	47	35	144	16	45	45	32	138
28-8-56	17	45	48	35	145	16	44	46	32	138
29-8-56	19	45	47	34	145	18	41	45	32	136
30-8-56	18	46	46	33	143	17	41	44	31	133
Σύνολον					1.272					1.188
M. O. Θερμοκρ. ἡμέρας					35,33° C.					33° C.

Ο ἀποληφθεὶς ξηρὸς σταφιδόκαρπος, ποιοτικῶς, δὲν παρουσίασεν οὐδὲνίαν ὀφθαλμοφανῆ διαφοράν με-

ταξὺ τῶν δύο τρόπων ἀποξηράνσεως. Τὸ πείραμα τοῦτο, ἐπαναληφθέν, εἰς τριπλοῦν καὶ ὑπὸ τοῦ κ.