

και θερμός). Διήρκεσε δὲ αὐτὴ εἰς μὲν τὸ κοινὸν ὑπόστεγον μέχρι τὴν 15)9)56 διὰ τὸ κατώτερον πάτωμα (ἡμέραι 25) καὶ μέχρι τὴν 17)9)56 διὰ τὸ ἀνώτερον (ἡμέραι 27), εἰς δὲ τὸ «πλαστικὸν ὑπόστεγον» μέχρι τὴν 6)9)56 διὰ τὸ ἀνώτερον πάτωμα (ἡμέραι 16) καὶ μέχρι τὴν 8)9)56 διὰ τὸ κατώτερον (ἡμέραι 18).

Πρὸς τὸ τέρμα τῆς ἀποξηράνσεως ὁ σταφιδόκαρπος, ἀμφοτέρων τῶν ὑποστέγων, ἐξετέθη εἰς τὸν ἥλιον πρὸς ὀλοκλήρωσιν αὐτῆς, μετὰ τὴν

ἐξῆς διαφορὰν, ὅτι ὁ σταφιδόκαρπος τοῦ πλαστικοῦ ὑποστέγου ἐξετέθη εἰς τὸν ἥλιον μόνον ἐπὶ διήμερον, ἐνῶ ὁ τοῦ κοινοῦ ὑποστέγου ἐπὶ πενθήμερον, διότι ἐπεβραδύνετο ἡ ἀποξήρανσις τούτου ὑπὸ σκιάν.

Αἱ σημειωθεῖσαι θερμοκρασίαι κάτωθεν τῶν ὑποστέγων κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀποξηράνσεως καὶ εἰς τὸ αὐτὸ ὕψος ἀπὸ τοῦ ἐδάφους (0,65 μ.) δίδονται ὑπὸ τοῦ κατωτέρω πίνακος II :

Π Ι Ν Α Κ Ε Ι Ι

Σημειωθεῖσαι θερμοκρασίαι κάτωθεν τῶν ὑποστέγων ἀποξηράνσεως

Χρονολογία	Ω Ρ Α Ι Λ Η Ψ Ε Ω Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν									
	Ἐπὶ κοινὸν ὑπόστεγον					Ἐπὶ πλαστικὸν ὑπόστεγον				
	6	10	14	18	Σύνολον	6	10	14	18	Σύνολον
22-8-56	—	32	34	33	99	19	33	38	33	123
23-8-56	17	30	32	32	111	18	33	38	32	121
24-8-56	26	29	30	26	111	26	33	30	27	116
25-8-56	16	29	31	28	114	15	32	38	29	114
26-8-56	15	29	31	29	104	14	36	35	30	115
27-8-56	12	32	35	33	112	17	36	39	33	125
28-8-56	16	33	37	32	118	16	38	40	33	127
29-8-56	17	31	36	32	116	16	36	40	33	125
30-8-56	16	30	34	30	110	17	35	39	31	122
31-8-56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1-9-56	16	30	35	29	110	17	34	39	32	122
2-9-56	16	31	36	30	113	17	35	40	33	125

Σύνολον

1.218

1.337

Μ. Ο. Θερμοκρ. ἀέρος

28,3° C.

30,38° C.

Ποιοτικῶς ὁ ἀποληφθεὶς σταφιδόκαρπος ἦτο ἐξαιρετικὸς δι' ἀμφοτέρα τὰ ὑπόστεγα, παρουσιάσας ὅλα τὰ προσόντα τῆς ἐκλεκτῆς ποιότητος σκιάς. Κατὰ τὴν μακροσκοπικὴν μάλαστα ἐκτίμησιν (ὑπὸ ἐπιτροπῆς)

τῆς ποιότητος τῶν σταφίδων, αἱ ὀποῖαι προῆλθον ἀπὸ διάφορα πειράματα ἀποξηράνσεως τοῦ Ἰνστιτούτου Σταφίδος, ὁ σταφιδόκαρπος τοῦ πλαστικοῦ ὑποστέγου κατέλαβε διακριτικῶς τὴν πρώτην σειράν.