

κῶν δεινῶν εἰς τὴν Πατρίδα. Οἱ Ἀγῶνες τὴν ἐπιβίωσην τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς, χάρις εἰς τὸ πολύτιμον καὶ εὐγενικό προϊόν τῆς Ηελοποννήσου ακῆς γῆς, στάθηκε ἴσχυρὸς καὶ ζωντανὸς ἀπὸ τὴν ἀρχὴν μέχρι τὸ τέλος. Οἱ δὲ γραμμὲς ποὺ γράψουμε σχετικά, εἶναι ἔ-

λάχιστο ποσοστὸν εὐγνωμοσύνης πρὸς τὴν μαύρη σταφίδην καὶ πρὸς τὰ χέρια ποὺ τὴν καλλιεργοῦν καὶ ἔνα μεγάλο εὐχαριστῶ ἐκ μέρους ὅλων μας ποὺ τὰ ἀξιέσιν ἀπόλυτα.

ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



Γενικὴ ἀνασκόπησις τῆς Σταφιδοκαλλιεργείας

Μετεωρολογικὰ Δελτία



Κατὰ τὸν μῆνα Ιανουαρίου ἐσημεώθησαν περιῳρισμέναι βροχοπτώσεις καὶ εἶχαμε 5 ἡμέρας, καθ' ᾧ ἐσημειώθη πτώσις μερικοῦ παγετοῦ.

Συνετελέσθη κατὰ μέγα ποσοστὸν ὁ κλαδοκάθαρος τῆς σταφιδαμπέλου, ὡς καὶ ἡ λίπανσις αὐτῆς. "Ηρχισεν ἐπίσης ἡ καταπολέμησις τῆς θικασίας, δύσιον ἔχει ἐκδηλωθῆναι αὔτη, δι' ἀρσενικώδους νατρίου εἰς διάλυμα πυκνότητος 1,5ούο εἰς δραστικὸν στοιχεῖον.

'ΕΕΣ ἄλλου, ὁ μῆν Φεβρουαρίος ὑπῆρξε λίαν ξηρὸς ἄνευ βροχῶν. Εἰς τὴν Μεσσήνην, ἡ μηνιαία βροχόπτωσις τοῦ Φεβρουαρίου τὸ 1956 ἦτο 263,5 χιλ., ἐνώ τὸ 1957 ἦτο 15,5 χιλ. Όμοιως εἰς τὸ Ίνστιτούτον Πύργου αἱ βραχοπτώσεις ἀντιστοίχως ήσαν 272 χιλ. τὸ 1956 καὶ 20,5 χιλ. τὸ 1957.

'Ἐπισής ἡ μέση μηνιαία δερμοκρασία ἀνήλθεν ύπερ τοὺς 10°C καὶ μόνον κατὰ τὸ πρῶτον 10ήμερον τοῦ μηνὸς ἐγκατείωθη πτώσις παγετοῦ, ὡς καὶ χαλάζης μὲ λίαν περιωρισμένας ζημίας.

Ἡ ἀνύψωσις τῆς δερμοκρασίας προεκάλεσε τὴν ἔναρξιν τῆς κυκλοφορίας τῶν χυμῶν, τὴν ἐμφάνισιν τῆς δακρυροΐας καὶ τὴν ἄκαριον ἐξόγκωσιν τῶν ὄφθαλμων. Αἱ ἐκδηλώσεις αὕται προεκάζουν πρώτην ἔναρξιν τῆς θλαστήσεως, γεγονός τὸ δόπτον καθιστᾶ πλέον ἐπιφόδους τούς παγετούς τῆς ἀνοίξεως.

Καλλιεργητικὴ ἐργασία:

Συνεχίσθη ὁ κλαδοκάθαρος καὶ τὸ κλάδευμα. Χάρις εἰς τὴν καλοκαιρίαν, συνετελέσθη κατὰ μέγα μέρος, ἡ σκαρφή.

Λόγω τῆς ἐνάρξεως τῆς κυκλοφορίας τῶν χυμῶν, εἰς πολλάς περιπτώσεις δὲν ἐπρόλαβαν νάνε φραγμόδους καταπολέμησιν τῆς θικασίας, δύσιον αὔτη ἔχει προσδιορισθῆ.

M. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΝΤΗΣ Γ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΣΤΑΦΙΔΟΣ Α.Σ.Ο.