

οὐδὲν σταφιδεργασίον ἀφίεται ἀκόλυπτος ἢ σταφίς, εἴτε εἶναι συσκευασμένη, εἴτε ὄχι.

Συσκευασία τῆς Σταφίδος. Περίπου τὰ 50οο τῆς σταφίδος Thompson συσκευάζονται εἰς χαρτονοκίβωτια τῶν 30 I.B.S (13,6 χ)μα, πρὸς τροφοδότησιν τῶν βιομηχανιῶν παρασκευασμάτων ἀρτοποιίας ἢ ζαχαροπλαστικής, τὰ ἕτερα δὲ 50οο εἰς μικρὰ σακκίδια ἢ κυτία (ἀπὸ πλαστικά φίλμς ἢ χαρτόνι), διὰ τὴν τρο-

φοδότησιν τῶν παντοπωλείων.

Καταπολέμησις τοῦ ἐντόμου *Drosophila (κρασόμυγα)*. Πρὸς τοῦτο, ἔνα καὶ μόνον μέσον ὑπάρχει: ἀπόλυτος καθαριότης κατὰ τὴν ἐπεξεργασίαν τῆς σταφίδος εἰς τὸ παραγωγικὸν καὶ συσκευαστικὸν στάδιον (τὰ λοιπὰ βλαβερὰ ἔντομα τῆς σταφίδος καταπολεμοῦνται δι' ὑποκαπνισμοῦ με φάρμακα, ὡς τὸ μυρμηκικὸν αἰδύλιον καὶ βρωμιούχον μεθύλιον).

Καλλιεργητικαὶ διεργασίαι

Λίπανσις σταφίδαμπέλων. Ὑπὸ τῶν Καλιφορνέζων σταφίδοπαραγωγῶν χρησιμοποιοῦνται εὐρύτατα τὰ χημικὰ λιπάσματα, παρ' ὅλον ὅτι οἱ συσκευασταὶ φρονοῦν ὅτι ταῦτα συντελοῦν περισσότερον εἰς τὴν παραγωγὴν ζύλου ἢ καρποῦ ὅταν δέ, λόγω τῆς εὐρωστίας, τὸ κλάδευμα γίνεται μακρύτερον, λαμβάνονται μὲν ὑψηλότερα ἔσοδα, ἡ ποιότης ὁμῶς τοῦ καρποῦ εἶναι κατώτερα. Διὰ τὴν λίπανσιν γίνεται χρῆσις ἀζωτούχων λιπασμάτων εἰς ἀναλογίαν 6—11 χ)μων ἀζώτου κατὰ στρέμμα.

Τρυγητὸς καὶ ἀποξήρανσις. Αἱ σταφυλαί, κοπτόμεναι ἀπὸ τοῦ κλήματος, τοποθετοῦνται ἐπὶ τεμαχίων ἀδιαβρόχου χάρτου μήκους 60 ἐκατοστομέτρων, ἀφίονται δὲ πρὸς ἀποξήρανσιν εἰς τὸν ἥλιον ἐντὸς τοῦ ἀμπελώνος καὶ εἰς τὰ ἐνδιάμεσα μεταξὺ τῶν γραμμῶν διαστήματα.

Μετὰ τὸ πέρασ τῆς ἀποξηράνσεως, ἀνοδιπλοῦται ὁ χάρτης εἰς σχῆμα μικρῶν κυλινδρῶν, ἡ δὲ περιεχομένη ἐντὸς τούτων σταφίς φέρεται μετ' ὀλίγον ἐντὸς τῶν εἰδικῶν ξυλίνων κιβωτίων μεταφορᾶς καὶ ἀποθηκεύσεως.

Εἰς τὴν καλλιέργειαν τῆς σταφίδος χρησιμοποιοῦνται ὡς ἐργάται κυρίως Μεξικανοί, ἀμειβόμενοι ἀντὶ ἐνὸς Δολλάριου ὡριαίως. Κατὰ τὸν τρυγητὸν, ἕκαστος ἐργάτης ἐργάζεται 70—80 ὥρας ἑβδομαδιαίως.

Ὁ μέσος ὄρος τῆς κατὰ παραγωγὸν καλλιεργούμενης ἐκτάσεως σταφίδαμπέλων ἐνέρχεται εἰς 80 στρέμματα, ἐν τούτοις ὑπάρχουν παραγωγοὶ με ἰδιοκτησίαν μέχρι καὶ 8.000 στρεμμάτων.

Τὸ ἐτήσιον ὕψος βροχῆς εἰς τὴν κυριώτεραν περιφέρειαν καλλιέργειας τῶν σταφίδαμπέλων εἶναι λίαν χαμηλόν, ἀνερχόμενον εἰς 228—230 Μ)Μ, δι' ὃ καὶ αἱ σταφίδαμπελοὶ ἀρδεύονται με ποσότητα ὕδατος 126 Μ)Μ περίπου, κατὰ στρέμμα, ἐτησίως. Τὸ ἀρδευτικὸν ὕδωρ ἀντλεῖται ἐκ φρεάτων βάθους 18 ἕως 100 μέτρων ἢ λαμβάνεται ἐξ ἀρδευτικῶν αὐλάκων, ὅπου ὑπάρχουν τοιοῦτοι.

Κόστος παραγωγῆς. Τοῦτο, ὑπολογιζόμενον βάσει τῆς στρεμματικῆς ἀποδόσεως τοῦ ἔτους 1955 ἐκ 450 χ)μων (350 ὀκ. περίπου), ἀνέρχεται συνολικῶς εἰς 154,6 Δολλάρια κατὰ μετρικὸν τόννον ἢ περίπου 6 ὄρχ. κατ' ὄκαν.

Ἀσφάλισις τῆς Σταφιδοπαραγωγῆς

Κατὰ τὸ ἔτος 1956, πρᾶκτωρ τις τῶν Lloyd's τοῦ Λονδίνου ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἀναλαμβάνει τὴν ἀσφάλισιν τῆς σταφιδοπαραγωγῆς ἐναντίον ζημιῶν ἐκ βροχῶν παγετοῦ, ἡλιακῶν ἐγκαυμάτων, ἀνεμοθελλῶν, κινδύνων μεταφορᾶς, ἐκ στάσεων, πτώσεως ἀεροσακῶν καὶ τρο-

χοφόρων ὀχημάτων, πλὴν τῶν ἐκ πτώσεως χαλάζης.

Τὸ ἀσφάλιστρον κατὰ στρέμμα ποικίλει, ἀναλόγως τῆς περιοχῆς: κυμαίνεται ἀπὸ 1,68 ἕως 2,81 Δολλάρια, ἤτοι κατὰ χ)μον, με βάσιν παραγωγῆς 450 χ)μα κατὰ στρέμμα, 0,11—0,18 ὄρχ.