

Γενική άνασκόπησις τῆς Σταφιδοκαλλιεργείας

Μετεωρολογικὰ Δελτία



Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ

Καιρικοί συνθήκαι : Συνεχίσθη ἡ ἀνομβρίαι καὶ αἱ σημειωθεῖσαι Θαι ὑπῆρξαν ἐλαφρῶς χαμηλότεραι τῆς ἀντιστοίχου περιόδου τοῦ 1956. Μετὰ τὴν ἐπίσχεσιν τῆς βλαστήσεως, τὸ πλοῦσιον φύλλωμα, τὸ ὁποῖον ἐσχηματίσθη λόγω τῶν βροχῶν τοῦ Μαΐου καὶ παρὰ τὴν καθ' ἀρχὴν ἀνταγωνιστικὴν δράσιν τούτου ἐπὶ τῆς καρποφορίας, ἤδη τῇ ἐπιδράσει τῶν εὐνοϊκῶν κλιματολογικῶν συνθηκῶν (οὐχὶ πολὺ ὑψηλαὶ Θαι), ἠῤῥησε τὴν φυτοσυνδεδεικτὴν δραστηριότητα τῶν πρέμνων μὲ συνέπειαν τὸν ἐμπλουτισμὸν τῶν ραγῶν εἰς σάκχαρον. Οὕτω, ἐναντι τῶν ἀντιστοίχων ἡμερομηνιῶν τοῦ παρελθόντος ἔτους, κατὰ τὴν διανομιστὴν περιόδον αἱ σταφυλαὶ εἶναι περισσότερον ἐμπλουτισμέναι εἰς σάκχαρον.

Τὸ γεγονός αὐτὸ δὲ συντελέσῃ εἰς τὴν βελτίωσιν τῆς ποιότητος καὶ αὐξήσειν τοῦ βάρους τῆς παραγωγῆς εἰς τρόπον ὥστε ἡ ἐξ ἄλλων οἰτίων (ἀριθμὸς σταφυλῶν καὶ μικρὸ μέγεθος σταφυλῶν) σημειωθεῖσα μείωσις τῆς παραγωγῆς νὰ περιορισθῇ.

Εἰς τινὰς περιπτώσεις παρετηρήθη ὅτι ἡ χαράγις δὲν ἐλειτούργησε καλῶς, εἴτε λόγω ὀψίμου ἐφαρμογῆς τῆς συνεπεία τῶν βροχῶν τῆς ἀνοιξέως, εἴτε λόγω ταχείας ἐπουλώσεως τῆς συνεπεία ἐντόνου ἰσοπλασίας. Ὡς ἐκ τούτου, παρετηρήθη ἀνομοιόμορφος ὠρίμανσις καὶ μικροραγία.

Αἱ προσβολαὶ περνοσπόρου καὶ ὠιδίου ὑπῆρξαν κατὰ περιφέρειαι μικραὶ ἕως μέτριαι. Ἐσημειώθη δὲ καὶ προσβολὴ εὐδεμίδος, ἡ ὁποία εἰς τινὰς περιπτώσεις ὑπῆρξεν ἔντονος. Χλωρῶσις ἐξ ὑπερβολῆς ἀσθέντου εἰς τὸ ἔδαφος καὶ ἐλλείψεως ἀφομοιοσῆμου σιδήρου εἰς τὰ φύλλα, παρετηρήθησαν εἰς τινὰς περιοχὰς τῆς Κορινθίας καὶ τῆς Μεσσηνίας. Εἰς Φιλιατρὰ ἐσημειώθη χλωρῶσις ἐπὶ τῶν φύλλων, χαρακτηριστικὴ τῆς ἐλλείψεως μαγνηαίου.

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ

Καιρικοί συνθήκαι : Κατὰ τὸ 15δῆμερον τοῦ μηνὸς ἐσημειώθη καύσιον, παρετηρήθησαν δὲ μέγισταὶ Θαι ἀνώτεραι τῶν περσιωνῶν. Αἱ Θαι αὐταὶ μὲ τὴν ἔντονον διαπνοὴν ποῦ προκαλοῦν συνετέλεσαν εἰς τὴν ἐμφάνισιν πρῶρων ἀποξηράνσεων τῶν σταφυλῶν. Πάντως, λόγω τοῦ ὅτι ἤδη εὐρισκόμεθα ἐν ὄψει τρυγητοῦ, ἡ δυσμενὴς ἐπίδρασις τῶν ἡτο περιορισμένη. Ὁ τρυγητὸς ἤρχισεν ὑπὸ εὐνοϊκῶν συνθηκῶν διὰ τὴν ἀποξήρανσιν τῆς σταφίδος. Τὸ τελευταῖον 10ῆμερον τοῦ μηνὸς ἐσημειώθη βροχόπτωσης καθ' ὅλην τὴν σταφιδικὴν Πελοπόννησον, περιωρισμένη ὁμως διὰ τὴν προκαλέση αἰσθητῆς ζημίας, πλὴν τῆς Μεσσηνίας ὅπου ἔπεσαν 29 χιλ. βροχῆς καὶ ἡ σταφίς φέρεται ὡς ἐλαφρῶς βεβρεγμένη εἰς ποσοτὸν 30—40 % κατὰ περιοχὰς.

Ἡ ὠρίμανσις κατὰ γενικὸν κανόνα ἦτο ἐλαφρῶς πρωϊμότερα τῆς περσιωνῆς. Αἱ σταφυλαὶ ἦσαν πλουσιῶς ἐμπλουτισμέναι εἰς σάκχαρον, γεγονός τὸ ὁποῖον ἐπέδρασεν εἰς τὴν ποσότητα τῆς παραγωγῆς. Τοῦτο ἐμφαίνεται ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ ἀπόδοσις τῆς χλωρᾶς σταφίδος εἰς ξηρᾶν, συμφωνῶς πρὸς πειράματα τοῦ Ἰνστιτούτου Σταφίδος, ἐκυμάνθη ἐφέτος εἰς 38—40 %, ἐνῶ κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος αὐτὴ ἦτο 29—32 %. Ἡ διαφορά αὕτη τοῦ βάρους δὲ καλῶς ἐν μέρους τῆς ἐκτιμηθείσης μείωσης τῆς παραγωγῆς.

Ἀσθένεια : Ἡ προσβολὴ περνοσπόρου ἦτο ἐν γένει μετρία ὡς καὶ ἡ τοῦ ὠιδίου. Παρετηρήθη προσβολὴ εὐδεμίδος καὶ δευτερογενῆ σαπίματα, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ ζημία ἦτο κατὰ περιφέρειαι ἀπὸ 10—90 οο, ὡς ἀναφέρεται, διὰ τὴν περιφέρειαν τῆς Μεσσηνίας. Ὡς καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος, ἐσημειώθη ἀποξήρασις τοῦ ἄκρου τῶν σταφυλῶν, ὀφειλομένη εἰς ἀνεπαρκῆ τροφοδότησιν εἰς ὕψω τῶν φυτῶν.

(Ἐκ τοῦ Ἰνστιτούτου Σταφίδος)