

ἀπόψεως καιρικῶν συνθηκῶν. Ἡ ἐπικρατήσασα καιρικὴ ἀνω-
μαλία τῆς 21ης—23ης Αὐγούστου (βροχόπτωσης 2,5 Μ. Μ.) δὲν
ἐπέδρασε δυσμενῶς εἰς τὴν πορείαν τῆς ἀποξηράνσεως, ἡ δὲ
μεγάλη κακοκαιρία τῆς 4ης—6ης Σεπτεμβρίου (βροχόπτωσης

64 Μ. Μ.) εὗρε τὸν σταφιδόκαρπον εἰς τὸ τέλος τῆς ἀποξη-
ράνσεως αὐτοῦ.

Ὁ ἄμέσως κατωτέρω πίναξ I ἐμφανίζει τὴν διάρκειαν
ἀποξηράνσεως:

Π Ι Ν Α Ξ Ι

Χ ρ ό ν ο ς δ ι α ρ κ ε ί α ς Π ε ι ρ ά μ α τ ο ς Α'

ΣΤΑΦΙΔΑ- Σταφιδόπανον 4 X 8 μ.

Ἡ λ ι ο ς

ΛΩΝΑ	Ἡμερῆς	Ἄ ἡ ῥ ῖ ς	Διάρ- κεια ἡμέραι	Ἡμερῆς	Ἄ ἡ ῥ ῖ ς	Ἡμερῆς	Διάρ- κεια ἡμέραι
Α'	17 Αὐγ.	27 Αὐγ.	11	17 Αὐγ.	27-28 Αὐγ.	11-12	13
Β'	17 »	27 »	11	17 »	27 Αὐγ.	11	13
Γ'	19 »	29 »	10,5	19 »	1 Σεπτ.	12,5	12,5
Δ'	20 »	29 »	10	20 »	31 Αὐγ.	12	13
Ε'	21 »	3 Σεπτ.	14	21 »	—	—	16

Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Α Π Ο Ξ Η Ρ Α Ν Σ Ε Ω ς

Σταφιδόπανον 4 X 4 μ.

Διὰ τὴν συγκριμὴν τοῦ ἀποξηρανθέντος σταφιδόκαρπου
ἐλήφθησαν ὅτ' ὄψιν τὰ κριτήρια τῶν παραγῶν. Ὅπως ἐμ-
φανίζεται εἰς τὸν κατωτέρω πίνακα II ἡ περιεκτικότης τοῦ
ξηροῦ σταφιδόκαρπου εἰς ὑγρασίαν εἶναι χαμηλὴ. Τοῦτο πα-
ρατηρεῖται, διότι ἡ ἀποξηράνσις ἐπιχώρησε πέραν τοῦ κανο-
νικοῦ, λόγῳ τῆς παρατηρηθείσης κατα τὴν λήξασαν σταφιδι-

κὴν περίοδον ἀνισορραγίας τῶν σταφυλῶν εἰς σημαντικόν πο-
σοτόν, ὄχι μόνον ἐπὶ τῶν σταφυλῶν τῶν διαφορῶν πρέμων,
ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἀκόμῃ σταφυλῆς. Ἡ ἀνισορραγία αὐ-
τῇ, μὴ δυναμένη νὰ ἐξουδετερωθῇ διὰ τῆς διαλογῆς, συνετέ-
λεσεν εἰς τὴν παράτασιν τῆς ἀποξηράνσεως, ἵνα ἀποξηρανθῶν
καὶ αἱ γουλαὶ καὶ χονδραὶ ράγες.