

Π Ι Ν Α Κ Ι

Περιεκτικότητα εις ύγρασιαν και σάκχαρον ξηρού σταφιδοκάρπου πειράματος Α'

ΣΤΑΦΙ- ΔΑΛΩΝΑ	Πλαστικόν σταφιδόπανον 4 X 8 μ.	Πλαστικόν σταφιδόπανον 4 X 8 μ.	Πλαστικόν σταφιδόπανον 4 X 8 μ.
	Ύγρασ. %	Σάκχαρον %	Ύγρασ. % Σάκχαρον %
Α'	10,87	75	11,07 76,10 76,46
Β'	10,48	75,27	11,34 75 75,55
Γ'	9,92	76,10	10,08 75,82 75,55
Δ'	10,41	75,82	9,11 76,10 75,55
Ε'	10,12	74,19	— — 8,62 76,10

Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ πειράματος συνοψίζονται εἰς τοὺς κατωτέρω πίνακας III καὶ IV. Ἐκ τούτων, ὁ μὲν πρῶτος παρ-
χει αὐτοῦσια τὰ ποσοτικά ἀποτελέσματα, ὁ δὲ δευτέρος πα-
ρέχει τὰ ἀποτελέσματα ταῦτα ἀνηγμένα εἰς τὴν αὐτὴν ὕγρα-
σιαν (14 %) διὰ τὴν ἀκριβεστέραν σύγκρισιν τῆς ἐκαστοῦ αἰτίας
ἀποδόσεως εἰς ξηρὸν σταφιδόκαρπον τῶν δύο μεθόδων ἀπο-
ξηράνσεως.

Ποιοτικῶς δὲν παρουσιάσθησαν αἰσθηταὶ διαφοραὶ εἰς τὸν
ἀποληφθέντα ξηρὸν σταφιδόκαρπον καὶ τῶν δύο μεθόδων ἀ-
ποξηράνσεως. Ἡ μακροσκοπικὴ ἐξέτασις τούτου, γενομένη ὑπὸ
ἐπιτροπῆς γεωπόνων καὶ παραγωγῶν, δὲν ἀπέδειξε αἰσθητὴν
ὕπεροχὴν τοῦ σταφιδοκάρπου τῶν πλαστικῶν ἔναντι τοῦ
τοιούτου τοῦ ἡλίου. Εἰς ἀμφοτέραις τὰς περιπτώσεις ὁ σταφι-
δοκάρπος ἦτο καλῆς ποιότητος.