

Περὶ τὰς	276.718	έκμεταλλεύσεις	ἔχουν	έπιφάνειαν	ἀπό	0,01	έως	0,09	έκταρίων	27,	ο]ο
»	573,198	»	»	»	1	»	1,9	»			
»					2	»	2,9	»			
»					3	»	4,9	»			
»	114.327	»	»	»	5	»	9,9	»	57,5ο]ο		
»	25.912	»	»	»	10	»	19,9	»	11,5ο]ο		
»	5.361	»	»	»	20	»	49,9	»	2,6 ο]ο		
»	651	»	»	»	50	»	99,9	»	0,54ο]ο		
»	382	»	»	»	100	έκταρια καὶ ἄνω.			0,6 ο]ο		
									0,1 ο]ο		

Ο αλῆρος εἶναι λίαν κατατεμαχι-  
σμένος. Υπάρχουν 3.000 ἀγροτικαὶ ἔκ-  
μεταλλεύσεις τῶν δόποιν ὁ αλῆρος πε-  
ριέχει πλέον τῶν 10 χωριστῶν τεμα-  
χίων. Εἰς ὠρισμένας περιοχάς ὁ τεμα-  
χισμός καὶ ἡ διασπορὰ τῶν τεμαχίων  
καταλήγουν εἰς τὴν κονιορτοποίησιν  
τῆς ιδιοκτησίας.

Τὸ κλῖμα εἰς τὰς διαφόρους περιφε-  
ρέας τῆς Ἑλλάδος

5. Ἡ Ἑλλάς, ἀν καὶ περιβάλλεται  
ἀπὸ ὅλας τὰς πλευράς πλὴν τῆς βο-  
ρείου ὑπὸ τῆς θαλάσσης, παρουσιάζει  
μεγάλην ποικιλίαν ακλίματος. Γενικῶς,  
ὅπως καὶ εἰς ὅλας τὰς μεσογειακάς  
χώρας, ὁ χειμὼν εἶναι βροχερός καὶ τὸ  
θέρος θερμὸν καὶ ἔηρον. Ἡ ἀνοιξία εἰ-  
ναι βραχείας διαρκεῖας ἀλλ᾽ ἀντιθέτως  
τὸ φθινόπωρον διαρκεῖ πολὺ.

Απὸ τὴν ἀποψίν τοῦ ακλίματος δυ-  
νάμεθα νὰ διακρίνωμεν τὰς ἀκολού-  
θους περιοχάς :

α) Ὁρειναὶ περιοχαὶ. Τὸ ακλίματα εἰς  
αὐτὰς ἀπομακρύνεται τοῦ μεσογειακοῦ  
ακλίματος. Χαρακτηρίζονται ἀπὸ δρυμών  
χειμῶνα καὶ χαμηλᾶς θερμοκρασίας  
καὶ ἀπὸ θέρος μᾶλλον δροσερόν, πολ-  
λάκις δὲ καὶ ψυχρὸν καὶ, μόνον κατὰ  
βραχείας περιόδους, θερμὸν καὶ ἔηρον.

β) Ἡ ἡπειρωτικὴ περιοχὴ. Περιλαμ-  
βάνει τὸ ἐσωτερικὸν τῆς Ἕπειρου, τῆς  
Μακεδονίας, τῆς Θράκης καὶ τῆς Θεσ-  
σαλίας, καὶ δόπου τὸ ακλίματα εἶναι ἐνδιά-  
μενον μεταξὺ τοῦ μεσογειακοῦ ακλίμα-  
τος καὶ τοῦ ακλίματος τῆς Κεντρικῆς  
Εὐρώπης. Ἐν τούτοις, ἡ ἔηρος ἐποχὴ  
συμπίπτουσα μὲ τὴν θερμήν ἐποχὴν  
τοῦ ἔτους, αἱ χαμηλαὶ θερμοκρασίαι  
τῆς ψυχρᾶς ἐποχῆς (μέχρι 20°C), ἡ  
συχνότης τοῦ ψύχους καὶ ἡ πτωσίς  
χιόνος κάμινουν τὴν περιοχὴν αὐτὴν νά  
διοιδέῃ μὲ τὰς περιοχάς τῆς Κεντρι-  
κῆς Εὐρώπης.

Τὸ ἐτήσιον εὖρος τῶν θερμοκρασιῶν  
εἶναι ἀνώτερον τῶν 20°. Αἱ ἐτήσιαι  
πτωσίες βροχῶν δὲν εἶναι πολὺ ὑψη-  
λαὶ ἀλλ᾽ ἔχουν τάσιν δύμοιο μορφίας εἰς  
τὴν διανομὴν ὅπως εἰς τὴν Κεντρικήν

Εὐρώπην. Οἱ ἐπικρατοῦντες ἀνεμοὶ εἰ-  
ναι οἱ Βόρειοι, ψυχροὶ κατὰ τὸν χει-  
μῶνα ὅστις εἶναι τραχύς, ἐνῷ τὸ θέ-  
ρος εἶναι θερμὸν καὶ βραχείας διαρ-  
κείας.

γ) Ἡ περιοχὴ τοῦ Ἰονίου. Πρόκει-  
ται διὰ τὰς δυτικὰς ἀκτὰς τῆς Ἑλλά-  
δος καὶ τὰς Ἰονίους Νήσους. Τὸ ακλίμα-  
το εἶναι μεσογειακὸν εὐκρατον. Ἡ  
ψυχρὰ ἐποχὴ εἶναι ἡπιος. Τὸ ψυχρός  
καὶ ἡ χιών εἶναι σπάνια φαινόμενα  
ἀλλ᾽ αἱ θύελλαι εἶναι περισσότερον  
συχναὶ. Οἱ ἀνεμοὶ εἶναι ΝΔ. —ΒΔ.,  
ὑγροὶ καὶ σχετικῶς θερμοὶ προκαλοῦν-  
τες κατὰ τὸν χειμῶνα βροχάς, διπλα-  
σίας ἀπὸ ὅ, τι εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Ἐλ-  
λάδα.

δ) Ἡ περιοχὴ τοῦ Αιγαίου. Περιλαμ-  
βάνει τὴν Νοτιοανατολικὴν Ἑλλάδα,  
τὴν Θεσσαλίαν, τὰς νήσους τοῦ Αι-  
γαίου Πελάγους καὶ τὴν Κρήτην. Εἰς  
αὐτὰς τὸ ακλίματα εἶναι θερμὸν καὶ ἔηρον.  
Οἱ ἀνεμοὶ εἶναι ἔηροι καὶ αἱ πτωσίεις  
βροχῶν ἀσθενεῖς. Ἡ περιοχὴ αὐτὴ δια-  
κρίνεται λόγῳ τῆς ἔηρότητος τοῦ ἀ-  
ρροφορίας.

ε) Ἡ Νότιος περιοχὴ τῆς. (Πρόκει-  
ται διὰ τὴν μεσογειακὴν ἔρημον). Ἔδω  
ὑπάρχει ὁ μεταβατικὸς τύπος μεταξὺ<sup>τόπου</sup>  
τοῦ μεσογειακοῦ ακλίματος καὶ τοῦ ακλί-  
ματος τῆς ἔρημου. Ἐπησία πτωσίας βρο-  
χῆς εἰς τὴν Ιεράπετραν εἶναι 207 m/m,  
ἐγγίζουσα τὰ όρια τῆς ἔρημου. Ἡ ἀ-  
νομβρία διαρκεῖ πλέον τῶν 6 μηνῶν.  
Χάρις εἰς τὴν ἐπίδρασιν τῆς θαλάσσης  
δὲν παρατηροῦνται πολὺ ὑψηλαὶ θερ-  
μοκρασίαι.

Ἡ κατανομὴ τῶν καλλιεργουμένων  
ἐκτάσεων.

6. Ἡ κατανομὴ τῶν καλλιεργουμέ-  
νων ἐκτάσεων ἐν Ἑλλάδι εἶναι ἡ ἀκό-  
λουθος:

Τὸ μεγαλύτερον μέρος τῶν πεδιά-  
δων εὐρίσκεται εἰς μικρὸν ὑψος ἀπὸ  
τῆς θαλάσσης. Συναντῶνται ἐπίσης ἐπὶ<sup>τῶν</sup>  
δρέων ἀλλ᾽ εἶναι μικροτέρας σπου-  
δαιότητος.

Αἱ καλλιεργημέναι ἐκτάσεις εἶναι