

πείραμα τὸ 1955 χρησιμοποιήσασα Βορδιγάλλειον Πολτόν, Captan καὶ ούρια 0,7ο) ἀνευ νιτρικοῦ κάλεως διεπίστωσε μίαν αὔξησιν διοιώσ τῆς παραγωγῆς διὰ τοῦ Captan καὶ διὰ τῆς ούριας (δεῖκται παραγωγῆς : Β. Π. 100, Β. Π.—ούρια 117,9, Captan 103,7 καὶ Captan—ούρια 107,8). Ὅσαύτως παρετήρησε παρομοίαν ἐπιδρασιν ἐπὶ τοῦ συντελεστοῦ ἐπιμηκύνεως τῆς βλαστήσεως (Β. Π. 100, Captan 170, Β. Π.—ούρια 160, Captan—ούρια 183).

Ο. P. Dauguet εἰς μίαν σειρὰν 12 πειραμάτων ἀτίνα διεξήγαγεν εἰς διαφόρους περιοχὰς τῆς Γαλλίας τὸ 1957 διερευνᾶ ἔξονυχιστικῶς τὸ θέμα τῆς συγκριτικῆς ἐπιδράσεως τοῦ Captan καὶ τοῦ Β. Π. ἐπὶ τῆς καταπολεμήσεως τοῦ περονοσπόρου καὶ τῆς παραγωγῆς. Εἰς τὰ 4 ἐκ τῶν πειραμάτων ἐφήρμοσεν 20 ἐπαναλήψεις ἐνῶ εἰς τὰ ἔτερα 8, μὲν μεγαλύτερον ἀριθμὸν πρέμνων κατὰ τεμάχιον, 8 ἐπαναλήψεις.

Καὶ εἰς τοὺς 12 αὐτοὺς πειραματισμοὺς αἱ ἀποδόσεις ὑπῆρξαν ἀνώτεραι εἰς τὸ Captan ἔναντι τοῦ Β. Π. ἀπὸ 6,9ο)—113ο), εἰς τὰ 9 δὲ ἐκ τῶν 12 αἱ διαφοραὶ ὑπῆρξαν στατιστικῶς σημαντικαί. Διαφοραὶ ὡς πρὸς τὴν περιεκτικότητα εἰς σάκχαρον, ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸν σταφύλῶν κατὰ πρέμνον καὶ ὡς πρὸς τὸ μέσον βάρος ραγδὸς δὲν ὑπῆρξαν.

Τουναντίον ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸν

ραγῶν κατὰ σταφύλην καὶ εἰς τὰ 12 πειράματα ὑπῆρξεν ἀνώτερος εἰς τὸ Captan ἔναντι τοῦ Β. Π. κατὰ 10—60ο), αἱ διαφοραὶ δὲ αὗται εἰς τὰς 10 ἐκ τῶν 12 περιπτώσεων ὑπῆρξαν στατιστικῶς σημαντικαί. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συμπεραίνει ὅτι ἡ μειωμένη παραγωγὴ εἰς τὸν Βορδιγάλλειον Πολτόν, διφείλεται εἰς τὸ ὅτι οὕτος προκαλεῖ μίαν συμπληρωματικὴν καρπόρροιαν, πλὴν ὅμως διηχανισμὸς τῆς δράσεως ταύτης εἶναι πολὺ δίλιγον γνωστός. Οἱ ἔρευνηται τῆς Σχολῆς τοῦ Montpellier παρετήρησαν ὅτι γύρις πρέμνων ψέκασμένων μὲν Β. Π. ἐβλάστανον δυσκόλως ἐνῷ τοιάυτη ἐκ πρέμνων ψεκασμένων μὲν μή χαλκοῦχα παρασκευάσματα ἐβλάστανον φυσιολογικῶς.

Ἐξ ὅλου δὲ Bosian τοῦ Πειραματικοῦ Σταθμοῦ τοῦ Neustadt, ἀπέδειξεν ὅτι δὲ Β. Π. προκαλεῖ ἐπὶ τῆς ἀμπέλου μίαν ἐλλάτωσιν τῆς ἀφομοιώσεως τοῦ C 02.

Εἰς τὸ Ἰνστιτοῦτον Σταφίδος ἐγένετο πειραματικὴ ἐφαρμογὴ τῆς καταπολεμήσεως τοῦ περονοσπόρου διὰ Β. Π. καὶ Dithang τὸ πρῶτον τὸ 1954 ὑπὸ τοῦ κ. Γ. Μεϊμάρη. Ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων σημειούμεν ὅτι ὡς πρὸς τὴν ἀπόδοσιν δὲν ἐστιμέωθη διαφορὰ ἀν καὶ παρετηρήθη ἐλαφρὸν ράπτισμα εἰς τὰ τεμάχια τοῦ Β. Π., ὡς πρὸς τὴν μυκητοκτόνον δρᾶσιν των δὲ δὲν παρουσίασαν διαφοράς.

ΜΑΝΟΣ Ν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ