

Εἰς ἄκρας περιπτώσεις ἀποξήραν-  
σις τῶν νεαρῶν βλαστῶν.

‘Ανάπτυξις ταχυφυῶν βλαστῶν.

Θαμνώδης ἐμφάνισις βλαστήσεως.

Ἐπὶ ἀνεπτυγμένων φύλλων κατά-  
στασις μωσαϊκώσεως λόγῳ τῶν νυγ-  
μάτων (νέκρωσις εἰς τὸ σημεῖον τοῦ  
νύγματος καὶ ἀνοικτοῦ χρώματος  
κηλίς πέριξ αὐτοῦ). Αἱ σταφυλαὶ δυ-  
νατὸν νὰ μετατραποῦν εἰς ἔλικας.

#### Β λ ἄ β α :

Καθυστέρησις ἀναπτύξεως βλα-  
στῶν.

Καταστροφὴ ὡρισμένων φύλλων.

‘Ανάπτυξις ταχυφυῶν.

Κακὴ φυλλοποίησις.

‘Ανθόρροια ὅταν προσβληθοῦν αἱ  
ἀνθοταξίαι.

Συνθῆκαι ἐντόνου προσβολῆς

Αἱ προσβολαὶ τοῦ φυλλοκόπτου  
εἰναι ἔντονοι καὶ αἱ ἔξ αὐτῶν βλά-  
βαι ἐπὶ τῆς ἀμπέλου μεγάλαι, ὅταν  
οἱ συνθῆκαι κατὰ τὴν ἀνοιξιν δὲν εὐ-  
νοοῦν τὴν ταχείαν ἀνάπτυξιν τῆς  
βλαστήσεως.

#### Καταπολέμησις

Τὰ νεώτερα δεδομένα ἐρευνῶν πε-  
ρὶ τὴν συστηματικὴν καταπολέμησιν  
τοῦ φυλλοκόπτου καὶ τοῦ τετρανύ-  
χου (δμοσπονδιακὸς Σταθμὸς Λωζά-  
νης—‘Ελβετία 1957) συνοψίζονται εἰς  
τὰ ἀκόλουθα :

1. ‘Η σύγχρονος καταπολέμησις  
τοῦ φυλλοκόπτου καὶ τοῦ τετρανύ-  
χου δὲν εἰναι ἐφικτὴ διὰ τοὺς ἀνωτέ-  
ρω λόγους.

2. ‘Η καταπολέμησις τοῦ φυλλο-  
κόπτου δέον νὰ λαμβάνῃ χώραν ὅταν  
οἱ ἔξοδημένοι δφθαλμοὶ φθάσουν τὸ  
στάδιον τῆς πρασίνης κορυφῆς (ὅταν  
φουσκώνουν καλά τὰ μάτια).

3. ‘Η καταπολέμησις τοῦ τετρανύ-  
χου λαμβάνει χώραν 2-3 ἑβδομάδες  
ἄργοτερον ὅταν οἱ ἀναπτυσσόμενοι  
νεαροὶ βλαστοὶ τῆς ἀμπέλου ἀπο-  
κτήσουν μῆκος 5 ἑκατοστῶν.

4. Ὡς μᾶλλον ἀποτελεσματικά ἀ-  
καριοκτόνα διὰ τὸν φυλλοκόπτην ἀ-  
πεδείχθησαν:

α) Τὸ παραθείον εἰς δόσιν 0,1 τοῖς  
ἐκατόν.

β) Τὰ ἔλαιοπαρασθεῖα καὶ δὴ τὰ I-  
διοσκευάσματα ΠΑΚΟΛ (Pacol) εἰς  
δόσιν 0,75 τοῖς ἑκατόν, ΠΕΝΚΑΠΤΟΝ  
(Phencapton) εἰς δόσιν 0,1 τοῖς ἑκα-  
τόν.

Τὸ ΠΕΝΚΑΠΤΟΝ (Phencapton) μά-  
λιστα εἶναι δλιγότερον δραστικὸν  
κατὰ τῶν φυσικῶν ἔχθρῶν τοῦ Φυλ-  
λοκόπτου καὶ τοῦ Τετρανύχου καὶ  
δὴ τῶν ἀκάριων τοῦ γένους Τυ-  
ρφλεργοίων.

Τὸ φάρμακον τοῦτο ἀποτελεῖ ἔξ  
ὅλου εἰδικὸν ἀκαριοκτόνον κατὰ  
τοῦ τετρανύχου.

5. Τὸ πολυθειοῦχον ἀσβέστιον εἰς  
δόσιν 6 %, πρὸ τῆς ἐκπτύξεως τῶν  
δφθαλμῶν, ἐπίσης τὸ βρέξιμον θεῖον  
εἰς δόσιν 2 %, ἀπεδείχθησαν ἀνεπαρ-  
κῆ διὰ τὴν ριζικὴν καταπολέμησιν  
τοῦ φυλλοκόπτου καὶ τοῦ τετρανύ-  
χου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

#### ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥ Α.Σ.Ο.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 28-68

ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ‘ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 46-58

ΤΜΗΜΑ Β. ΣΤΑΦΙΔΟΣ, ΒΙΟ-  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΝ 46-42

ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 28-06