

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Του κ. ΕΛ. ΛΑΜΨΙΔΗ—«Δελτίον Α.Τ.Ε.»

1. Εισαγωγή

Ο Μολυσματικός έκφυλισμός της αμπέλου αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερον κίνδυνον διά την αμπελουργίαν, εις παγκόσμιον κλίμακα. Τοῦτο δὲ ἀφ' ἑνὸς μὲν λόγῳ τῆς προσβολῆς τῶν αμπέλων ὅλων τῶν αμπελουργικῶν χωρῶν, ἀφ' ἑτέρου δὲ τῆς ἀνυπαρξίας θεραπευτικῶν μέσων.

Τὸν Ἰούνιον τοῦ 1956 συνήλθον εἰς Βερόναν τῆς Ἰταλίας εἰδικοί αμπελουργοὶ καὶ φυτοπαθολόγοι διαφόρων χωρῶν πρὸς συζήτησιν τοῦ προβλήματος, ἔλαβον δὲ διαφόρους ἀποφάσεις, μετὰ τῶν ὁποίων καὶ τὴν κάτωθι: «Οἱ σύνεδροι ἐπιμένουν, ὅπως οἱ αμπελουργοὶ διαφωτισθῶν κατὰ τὸ δυνατὸν καλλίτερον, ὥς πρὸς τὰ συμπτώματα καὶ τὰ μέτρα ἀντιμετωπίσεως τῆς ἀσθενείας διὰ τῶν ὁποίων δύναται νὰ ἐπιβραδυνθῇ ἡ ἐξάπλωσις ταύτης». Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος διὰ τὸν ὁποῖον ἐπιχειρεῖται ἡ σκιαγράφησις τῆς ἀσθενείας (συμπτώματα—μετάδοσις—παθογόνον αἷτιον—ἀντιμετώπισις). Ἐλπίζομεν ὅτι οὕτω θὰ βοηθηθῇ ὁ Ἕλλην αμπελουργὸς εἰς τὴν διακρίβωσιν τῶν ἐν τῷ αμπελῶνι, ἀσθενῶν ἢ ὑπόπτων πρέμνων

καὶ τὴν ἐξαίρεσιν τῶν ἀπὸ τὸν πολλαπλασιασμὸν (μοσχεύματα—καταβολάδες—ἐμβόλια).

2. Ἱστορικόν

Εἶναι ἀγνωστον πότε ἐνεφανίσθη ἡ ἀσθένεια αὕτη. Πάντως, προϋπήρχεν εἰς τὴν Εὐρώπην, πολὺ πρὸ τῆς Φυλλοξηρικῆς εἰσβολῆς, χωρὶς νὰ κινήσῃ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν αμπελουργῶν λόγῳ τῆς ἀσημάντου ἐκτάσεώς της ἢ ἐπέκτασός της περιορίζετο ὑπ' αὐτῶν τούτων τῶν παραγωγῶν, οἵτινες ἀπέκλειον τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἀπαντα τὰ μὴ παραγωγικά, καχεκτικά πρέμνα. Ἡ Φυλλοξηρική εἰσβολὴ καὶ ἡ παραγωγή ἐρρίζων ἐμβολιασμένων μοσχευμάτων εἰς μεγάλας ποσότητας διὰ τὴν ἀναφύτευσιν τῶν ὑπὸ τῆς φυλλοξήρας καταστραφέντων αμπέλωνων, ἐπέφερε τὴν διασπορὰν τῆς νόσου καὶ τὴν ἐντασιν τῶν προσβολῶν.

Ἡ ὀλοὴν μεγαλυτέρα ἔντασις καὶ ἔκτασις τῶν προσβεβλημένων αμπελῶνων, προκάλεσε τὰς ἀνησυχίας τῶν ἐπιστημόνων.

Τὸ 1947 συνήλθον εἰς Παρισίους ἡ πρώτη διεθνὴς σύσκεψις ἐδικῶν ἐπι-