

μῶν περίπου, ἡ δὲ τιμὴ διαθέσεως τοῦ χαρουπιοῦ ὑπὸ τῶν παραγωγῶν θ' αὐξηθῇ τοῦλάχιστον κατὰ 50 ο)ο καὶ ἄνω τῆς σημερινῆς.

γ) Βιομηχανία βαλανιδίου

Ἡ συνολικὴ παραγωγή τοῦ δεψικοῦ βαλανιδίου ὑπολογίζεται κατὰ μέσον ὄρον ἐτησίως εἰς 12.500 τόννους. Λέγοντες δεψικὸν βαλανίδι ἐννοοῦμεν τὸ κύπελλον τοῦ καρποῦ τῆς δρυὸς τῆς αἰγίλωπος (κοινῶς βαλανιδιάς), ἐν ἄν-

τιθέσει μὲ τὸ κτηνοτροφικὸν βαλανίδι, ὅποτε ἐννοοῦμεν τὴν βάλανον (χωρὶς τὸ κύπελλον) ὅχι μόνον τῆς βαλανιδιάς, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπολοίπων ποικιλιῶν δρυός.

Αἱ κυριώτεραι βαλανιδοπαραγωγικαὶ περιφέρειαι εἶναι ἡ Αἰτωλία καὶ Ἀκαρνανία (Βάλτος—Ἀστακὸς κλπ.), ἡ Λακωνία (Γύθειον), Κρήτη (Ρέθυμνον), Ἀλεξανδρούπολις, Κέα, Μυτιλήνη, Θεσπρωτία, Ἀρκαδία.

(Συνέχεια εἰς τὸ ἐπόμενον)



Γενικὴ ἀνασκόπησις τῆς Σταφιδοκαλλιεργείας

Μετεωρολογικὰ Δελτία



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Αἱ χαμηλαὶ βροχοπτώσεις, εἰς τὸ ἥμισυ περίπου τοῦ Ἰανουαρίου 1958 αἵτινες ἐσημειώθησαν εἰς ὅλην τὴν σταφιδικὴν Πελοπόννησον ἐπέτρεψαν τὴν καλὴν ἐκτέλεσιν τῶν χειμερινῶν ἐργασιῶν εἰς τὰς σταφιδαμπέλους.

Οὕτω ἡ περιλάκνωσις, ἡ λίπανσις καὶ κλαδοκάθαρος ἐγένοντο κανονικῶς καὶ ἀπροσκόπτως.

Αἱ θερμοκρασίαι ἐλαχιστοτάτην διαφορὰν παρουσίασαν τῶν τοῦ παρελθόντος ἔτους (Ἰανουάριος 1958).

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Κατὰ τὴν μῆνα Φεβρουάριον ἡ σταφιδάμπελος παρέμεινεν ἐν χειμεριᾷ ἀναπαύσει, ἐκτὸς ἐλαχίστων περιπτώσεων (Παράρτημα

Φυλιατρῶν) καθ' ὅς λόγῳ ὑψηλοτέρων θερμοκρασιῶν, ὀφθαλμοὶ τινὲς ἔφθασαν εἰς τὸ προστάδιον τῆς βλαστήσεως (διόγκωσις).

Αἱ θερμοκρασίαι γενικῶς ὑπῆρξαν λίαν χαμηλαί, σημειωθέντων κατ' ἐπανάληψιν παγετῶν.

Ἡ σχετικὴ ὑγρασία ἐκινήθη εἰς ὑψηλὰ ἐπίπεδα, ἐνῷ τουναντίον αἱ βροχοπτώσεις ἦσαν ἐλάχισται, σημειωθείσης εἰς διαμερίσματά τινα καὶ τελείας ξηρασίας.

Ἡ σημειωθείσα ξηρασία ἐπέτρεψεν ὥπως γίνονιν αἱ καλλιεργητικαὶ ἐργασίαι (σκαφή, λίπανσις, ὑποστήλωσις) εὐχερῶς, πλὴν ὅμως τὰ λιπάσματα παρέμειναν εἰς τὸ ἔδαφος ἀδιάλυτα καὶ ὥς ἐκ τούτου, ἐὰν αἱ μελλοντικαὶ βροχοπτώσεις δὲν εἶναι ἐπαρκεῖς, αἱ ζημίαι θὰ εἶναι ἀναπόφευκτοι.

(Ἐκ τοῦ Γεωργικοῦ Τμήματος Α.Σ.Ο.)