

Διαπιστώσεις καὶ Συμπεράσματα

1. Ὡς πρὸς τὴν προσβολὴν τῶν φύλων εἰς τὸ Capitan ἐσημειώθη σημαντικῶς μικροτέρα προσβολὴ ἔναντι τοῦ βορδιγαλλείου πολτοῦ, τὸ 1957, μὴ παρατηρηθεῖσα τὸ 1958 ὅτε οὐδεμία διαφορὰ μεταξὺ τῶν τριῶν δοκιμαζομένων φαρμάκων, παρετηρήθη.

2. Ὡς πρὸς τὴν προσβολὴν τῶν σταφυλῶν ἡ ἀποτελεσματικότης καὶ τῶν τριῶν φαρμάκων ὑπῆρξεν ἡ αὐτή. Μὲ προσβολὴν τῶν μαρτύρων περὶ τὸ 70 ο) ἡ προσβολὴ καὶ εἰς τὰ τρία δοκιμαζόμενα μυκητοκτόνα ἐκυμάνθη μεταξὺ 0 καὶ 2 ο).

3. Διεπιστώθη σαφής ἀποτελεσματικότης τοῦ Capitan καὶ δευτερεύοντως τοῦ Zineb ἐπὶ μὴ προσδιορισθείσης ἀσθενείας ἡ ὁποία προσβάλλει τὰς σταφυλάς. Οἱ βορδιγάλλειοι πολτὸς ὑπῆρξε σημαντικῶς ὑποδεέστερος εἰς τὴν καταπολέμησιν τῆς ἀσθενείας ταύτης, μὲ συνέπειαν μεγάλην μείωσιν τῆς παραγωγῆς.

4. Παρετηρήθη μεγάλη προσβολὴ ὡϊδίου εἰς δύο ἐπαναλήψεις τοῦ Zineb. Τοιοῦτον τι δὲν παρετηρήθη εἰς τὰ ἔτερα τῶν ἀντικειμένων τοῦ πειράματος, ὡς ἀλλωστε οὔτε καὶ εἰς τὰς ὑπολοίπους τρεῖς ἐπαναλήψεις τοῦ Zineb.

5. Ἡ παραγωγὴ χλωρᾶς σταφίδος καὶ κατὰ τὰ δύο ἔτη τοῦ πειράματος ὑπῆρξεν ἐντυπωσιακῶς ἀνωτέρα εἰς τὰ τεμάχια τοῦ Capitan καὶ δευτερεύοντως εἰς τὰ τοῦ Zineb ἔναντι τῆς παραγωγῆς τῶν τεμαχίων ἄτινα ἐδέχθησαν ψεκασμούς βαρδιγαλλείου πολτοῦ. Τὴν διαφορὰν αὐτὴν διὰ τὸ 1957 ἀπεδώσαμεν κατὰ κύριον λόγον εἰς τὴν δυσμενῆ ἐπίδρασιν τῆς ἀγνώστου ἀσθενείας ἡ ὁποία προσέβαλε τὰς σταφυλάς εἰς τὰ τεμάχια τοῦ βορδιγαλλείου πολτοῦ.

Τὸ 1958 παρ' ὅλον ὅτι ἡ διαφορὰ τῆς παραγωγῆς ὑπῆρξεν ὀλιγώτε-

ρον ἐντυπωσιακή, ἐν τούτοις λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ προσβολὴ τῶν σταφυλῶν ὑπὸ τῆς ἀγνώστου ἀσθενείας καὶ ἔξ ἄλλων αἰτίων ἡτο μικρὰ καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν ἡτο ἵκανη νὰ προκαλέσῃ τὸς σημειωθείσας διαφορὰς τῆς παραγωγῆς, κατέστη σαφής ἡ δυσμενῆς ἐπίδρασις τοῦ βορδιγαλλείου πολτοῦ εἰς τὴν παραγωγήν. Τὸ μέσον βάρος χλωρᾶς σταφίδος κατὰ σταφυλὴν ὑπῆρξε κατὰ 55 ο) ἀνώτερον εἰς τὰ τεμάχια τοῦ Capitan καὶ κατὰ 42 ο) εἰς τὰ τοῦ Zineb ἔναντι τοῦ βάρους τῶν σταφυλῶν τῶν προερχομένων ἐκ τεμαχίων ἄτινα ἐδέχθησαν ψεκασμούς βαρδιγαλλείου πολτοῦ. Ἡ ηὔξημένη αὐτῇ παραγωγὴ ἐπεβράδυνε τὴν ὥριμανσιν.

6. Τὸ μέσον βάρος κατὰ σταφυλὴν ὑπῆρξε σημαντικῶς ἀνώτερον εἰς τὰ τεμάχια τοῦ Capitan καὶ δευτερεύοντως τοῦ Zineb ἔναντι τῶν τεμαχίων τοῦ Βορδιγαλλείου πολτοῦ. Συσχετιζόμενον τὸ γεγονός τούτο μὲ τὰς γενομένας παρατηρήσεις ἐπὶ τῆς ἐμφανίσεως τῶν σταφυλῶν (ἀραιόραγες εἰς τὸν Β.Π.) μᾶς ὀδηγεῖ εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ βορδιγάλλειος πολτὸς ἐπιδρᾷ δυσμενῶς ἐπὶ τῆς συγκρατήσεως τῶν ραγῶν εἰς τὰς σταφυλάς, ἐνῶ ἔξ ἀντίθετου τὸ Capitan καὶ τὸ Zineb εύνοοῦν, συγκριτικῶς, τὴν συγκράτησιν τῶν ραγῶν ἀποφευγομένων οὕτω τῶν τόσον γνωστῶν εἰς τοὺς παραγωγούς καὶ ἐπιζημίων εἰς τὴν παραγωγὴν καρποροιῶν (ράπισμα), εἰς ᾧ ὑπόκειται, ἡ σταφιδάμπελος.

7. Αἱ ἀποδόσεις εἰς ξηρὰν σταφίδα διὰ τὰ τεμάχια τοῦ Capitan καὶ Zineb ὑπῆρξαν σημαντικῶς ἀνώτεραι τῶν τεμαχίων τοῦ βορδιγαλλείου πολτοῦ, τὸ 1957, ἐνῶ αὗται περιορίζονται εἰς τὰ ὄρια τῆς στατιστικῆς σημαντικῆς διαφορᾶς, τὸ