

ζωήν, ίδια σιδηρος, χαλκός, φωσφορικὸν δέξι καὶ ἀσθέστιον εἶναι σαφῶς ὑπερτέρα κατὰ τὰς περιπτώσεις χρησιμοποιήσεως συμπληρωματικῶς χῆμα. λιπάσματά των παρ' ὅτι κατὰ τὴν χρῆσιν μονομερῶς δργανικῶν λιποσμάτων.

”Η περιεκτικότης εἰς σιδηρον τῶν καρότων ἡτοι κατὰ 44 οὐ ύπερτέρα καὶ ἡ περιεκτικότης εἰς χαλκὸν τῆς μπανάνων κατὰ 66,7 οὐ χειλῆς καθ' ἥν περιπτωσιν ἔχοντος χρησιμοποιήση μόνον ζωϊκὴ κόπρος πρὸς λιπαντὸν τῶν ἀντιστοίχων καλλιεργειῶν.

Διὸ τὴν μελέτην τῶν βραχυματολογικῶν συνεπειῶν παρὰ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τῆς χρησιμοποιήσεως φυτικῶν προϊόντων κατὰ διάφορον τρόπον λιπανθέντων ὠργανώθη ὑπὸ δύμάδος ἔρευνητῶν πειραματισμὸς ἐπὶ 74 νηπίον ἐν καλῇ ὑγιεινῇ κατάστασι. Οἱ πειραματισμὸς ἀπέδειξεν ὅτι τὰ νήπια, τὰ διατραφέντα μὲ λαχανικὰ λιπανθέντα μὲ ζωϊκὴν κόπρον καὶ χῆμα. λιπάσματα ἡσαν εἰς καλυτέραν κατάστασιν, παρ' ὅτι τὰ διατραφέντα μὲ λαχανικὰ ἐκ μονομερῶς διὰ κόπρου λιπανθέντων τεμαχίων κατὰ τρεῖς ἐννοιας, ἥτοι εἰς τοῦ καλύτερου σχηματισμοῦ τῶν ἐρυθρῶν αἷμαστραρίων, ἐκ τῆς ἰσχυρότερος περιεκτικότητος τοῦ αἷματος εἰς βιταμίνην Α καὶ ἐκ μιᾶς μικροτέρας εὐχισθήσας εἰς τὰς παρεμπτωτικὰς παθολογικὰς προσβολάς.

”Ιδιαιτέρως ἐντυπωσιακὴ ὑπῆρξεν ἡ πτῶσις τῆς περιεκτικότητος τοῦ αἷματος εἰς σιδηρον εἰς τὰ νήπια τὰ διατραφέντα μὲ χόρτων λιπανθέντα καὶ ἡ μειώσις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν αἷμαστραρίων, πρᾶγμα δεικνύον ἐλλιποῦ αἷματογένεσιν. Ή αἵτια τῆς ἀναιμίας εἰς τὰ νήπια ταῦτα δέον νὰ ἀναζητηθῇ ἀναμφισβήτητος εἰς τὴν ἀνεπαρκῆ περιεκτικότητα τῶν παρεχομένων τροφῶν εἰς σιδηρον καὶ χαλκόν.

Στηριζόμενη ἐπὶ τοῦ ἀποτελέσματος τούτου ἡ ὁμάς τῶν ως ἄνω ἔρευνητῶν ἀποφανεῖται ὅτι «εἴ τοι ἀποτελέσματος ἐπιστημονικῆς ἔρευνῆς διακριθοῦται ὅτι ἡ συμπληρωματικὴ χημικὴ λίπανσις οὐδεμίλαν βλάβην ὑπάτην δύναται νὰ προκαλέσῃ, ἀλλ' ἀντιθέτως ἡ ἀστακεῖ μίαν σαφῶς εὐνοϊκὴν ἐπιδράσιν ἐπὶ τῆς ὑγιεινῆς διατροφῆς τῶν νηπίων ὑπὸ τὴν πρωτητίουν ὅτι ἡ φυσιολογικὴ λιπορροποιία μεταξὺ τῶν θρεπτικῶν στοιχείων δὲν θὰ διαταραχήσῃ δι' ἐνδές ἐφοδιασμοῦ, εἰτε πολὺ ἀφθίσουν εἴτε πολὺ ἐλλιποῦς.»

Μόνον ἀλγίστος λίπανσις τῶν καλῆργειῶν κατὰ τρόπον δινορρόπτητων, πρὸς ἔξωθλησιν τῆς παραγωγῆς ὡς συμβαίνει εἰς τὰς κηπευτικὰς καλῆργεις διὰ τῆς ἀριθμοῦ παραγωγῆς ἐκφυλισμὸν καὶ ὑποβάθμισιν τῆς ποιότητος τῶν προϊόντων τὴν ποιότηταν.

ἀκριβῶς διορθώνομεν διὰ τῆς δρθῆς χρησιμοτοιχείως χῆμα. λιποσμάτων.

Εἰς τὴν Ἀμερικὴν ἡ Ἐταιρεία Κάμπτελ Σάουθ, μια τῶν μεγαλύτερων ἀγοραστριῶν τομάτας, ἤτις ἐδαπάνησεν ἀφθονον χρῆμα δι' ἐρεύνας πρὸς παρογωγὴν καλυτέρας ποιότητος προϊόντων δι' ίδιαν αὐτῆς χρῆσιν, ἐπιστημονίεν τὴν ἀξίαν τῶν χημικῶν λιπαντόματων πρὸς βελτίωσιν τῆς ποιότητος τῶν καρπῶν. Ἐπειδὴ, ἀφ' ἑτέρου διετυπώθη ἡ γνώμη διτὶ ἡ χρησιμοποιήσις δργανικῶν λιπαντόματων ἔδινε καλύτερα ποιοτικῶν προϊόντων ὡργανώθη ὑπὸ τῆς ἀνωτέρως Ἐταιρείας συγκριτικὸς πειραματισμὸς διὰ τῆς χρῆσεως ἀφ' ἐνδές κόπρου ζώων καὶ ἀφ' ἑτέρου μίγματος χῆμα. λιπάσματων ἀνταποκρινομένων ποσοτικῶν εἰς τὴν σύνθεσιν τῆς ζωϊκῆς κόπρου. Ἐκ τῆς συγκρίσεως πρόκεινε διτὶ ἡ ἀπόδοσις μὲ χῆμα. λιπάσματα ὑπῆρξεν κατὰ 30 οὐ ύπερτέρα ἔκεινης τῆς ἐπιτευχθείσης διὰ κόπρου καὶ οἱ παραχθέντες μὲ τὴν χρῆσιν χῆμα. λιπαντόματων καρποὶ εἰχον καλύτερον χρῶμα, περισσότερα στερεά, περισσότερα τέφραν σακχάρου καὶ δγυκομετρικὴν δέξιαν, ἐξ ἔκεινων τὰ ὄποια παρρήθησαν ἐπὶ τῶν τεμαχίων τῶν λιπανθέντων διὰ κόπρου.

”Η Ἐθνικὴ Ἔνωσις Κονσερβοποιίας Ἀμερικῆς τῆς ὁποίας τὰ μέλη ίδιωτες ωφελοῦνται ἀπὸ τὴν βελτίωσιν τῆς ποιότητος τῶν καρπῶν, τούς ὄποιους ἐπεξεργάζονται, κατέληξεν εἰς τὸ αὐτὸν συμπέρασμα. Οἱ καλύτερος ἔρευνητῆς τῆς ἀφοῦ ἐπεισκόπησε τὴν ἐκτελεσθεῖσαν πειραματικὴν ἐργασίαν πρὸς διεργήσιν τῶν ἀποτελέσματων ἐκ τῆς ἐφρημογῆς ἀφ' ἐνδές μὲν χῆμα. λιπαντόματων καὶ ἀφ' ἑτέρου δργανικῶν τοιούτων ὡς πρὸς τὴν εἰς ἀλατα καὶ βιταμίνας περιεκτικότητα ἔκεινων ἐκ τῶν λαχανικῶν καὶ δπωρῶν ἀτινα συνιστῶνται ὑπὸ τῶν διαιτολόγων ὡς μέρος τῆς διάτησης τῶν νηπίων καὶ ἐφίβων, κατέληξεν εἰς τὸ συμπέρασμα διτὶ ἡ ἀποτελέσματα ἀνασκευάζουν τὸν λισχυρισμὸν διτὶ ἡ χρησιμοποιήσις τῶν χημικῶν λιπαντόματων πρὸς ἐπίτευξιν ὑψηλῶν ἀποδόσεων καὶ ὑψηλῆς ποιότητος λαχανικῶν καὶ δπωρῶν μειώνει τὴν θρεπτικὴν ἀξίαν τῶν προϊόντων αὐτῶν δι' ἀνθρωπίνην κατανάλωσιν. Λαχανικά καὶ δπωραις ὑψηλῆς ἀποδόσεως καὶ ποιότητος δύνανται νὰ παραχθῶσι ὑπὸ συνήθηκας μιᾶς καλῶς ἴσορροπημένης παρογωγῆς τῶν κυρίων θρεπτικῶν στοιχείων. Τὸ ζήτημα διὰ τὰ στοιχεῖα ταῦτα παρέχονται εἰς τὸ ἕδαφος ὑπὸ δργανικὸν ἢ ἀνόργανον πηγῆν εἰναι ἀδιάφορον διὰ τὸν μεταβολισμὸν τοῦ φυτοῦ.»

”Ἐπὶ τῆς ποιότητος τῶν καρπῶν (χρῶμα, δργανοληπτικὴ ίδιοτήτες, δρωμα κ.λ.π.) γενικῶς θεωρεῖται διτὶ μεγαλυτέραν σημασίαν ἔχασκον συνθῆκαι ως ἡ ἡλιοφάνεια, ἡ