

# ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΤΡΥΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ CHIAVENASCA - BRUGNOLA

Μετάφρασις ἐκ τοῦ «Rivista di Viticoltura e di Enologia»  
ὑπὸ τοῦ γεωπόνου τοῦ Α.Σ.Ο. κ. ΣΠΥΡ. Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ

Ἄπο πολλῶν ἑτῶν δὲ μολυσματικὸς ἔκφυλισμὸς τῆς ἀμπέλου μελετᾶται ἐκ μέρους τοῦ Ἰνστιτούτου Φυτοπαθολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μιλάνου, δισον ἀφορᾶ τὴν ἔρευναν τῆς αἰτιολογίας, δ.α. μέσου μιᾶς μορφολογικῆς ἐπιλογῆς τῶν μητρικῶν φυτειῶν ἕξ δὲ τῶν προμηθεύντων εἶμβολια.

Ἡδη μερικοὶ ὅργανισμοι τὸν Ἐπαρχιῶν τῆς Λομβαρδίας (Pavia, Sondrio, Brescia, Milano), ἔχοντες ὑπ' ὄψιν τὴν σοβαρότητα τῆς δημιουργηθεῖσῆς καταστάσεως, ἐκ τῆς διάδοσης τοῦ μολυσματικοῦ ἐκφυλισμοῦ ἔζητοσαν, ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ ἐν λόγῳ Ἰνστιτούτου, τὴν πραγματοποίησιν μιᾶς ἀναμπελώσεως μὲ τὴν εγμένην ὑποκείμενα.

Εἰδικῶς τὸ Ἐπιμελήτηριον Ἐμπορίου, Βιομηχανίας καὶ Γεωργίας, ἀνήσυχον διὰ τὰς τύχας τῆς Ἀμπελουργίας εἰς τὴν Valtellinese ὑπεκίνησαν μίαν εὐρεῖαν ἔργασίαν ἔχηγινσες τῆς ἀμπέλου, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν δημιουργίαν ἑνὸς φυτωρίου συνισταμένου ἕξ ἐπιειλεγμένων φυτῶν.

Τὸ φυτώριον αὐτὸν ἀποτελεῖ τὸν πρῶτον πυρῆνα ἐπειλεγμένης ἀμπέλου καὶ ὀφείλει νὰ προμηθεύῃ τὰ μοσχεύματα διὰ τὴν σύστασιν ἀμπελώνως τιθεμένου ὑπὸ τὸν ἔλεγχον τοῦ Ἰνστιτούτου.

Διὸ νὰ δυνηθοῦν νὰ ἐπιλέξουν ἔνα πυρῆνα ἀμπέλου τῆς ποικιλίας Chiavennasca ἐκ τοῦ ὅποιου θὰ ἐφιδιασθοῦν τὰ ἔύλα διὰ τὴν δημιουργίαν τοῦ φυτωρίου, κατέστη ἀναγκαῖον νὰ ἔχεταισθούν τὰ φυτὰ πολλῶν ἀμπελώνων ἔνα πρὸς ἔνα.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἔργασίας αὐτῆς ἡδυνήθησαν νὰ συνεχίσουν τὴν μελέτην τοῦ ἐκφυλισμοῦ καὶ τῶν συμπτωμάτων αὐτοῦ.

Αἱ παρατηρήσεις διεξήχθησαν εἰς τὰς περισσότερος τυπικὰς ζώνας τῆς ἑπαρχίας, ἔνθα οἱ ἀμπελώνες συνιστάνται ἕξ ὀλικήρου ἀπὸ τὴν ποικιλίαν Chiavennasca.

Ἡ εὑρωστία καὶ ἡ παραγωγικότης τῶν πρέμνων ποικίλει ἀναλόγως τῆς ἥλικας,

τοῦ ἔδαφους καὶ τῶν καλλιεργητικῶν φροντίδων.

Οἱ Μολυσματικὸς ἔκφυλισμὸς εἰναι λίαν διαδεδομένος καὶ συναντῶνται σχεδόν ὅλα τὰ συμπτώματα τὰ περιγραφόμενα ὑπὸ τοῦ Fogliani καὶ μάλιστα μὲ αἰσθήτην αὔξησιν ἀπὸ ἔτους εἰς ἔτος.

Τὰ περισσότερον διαδεδομένα συμπτώματα εἰναι:

α) Βραχυγονάτωσις β) Διχάλωσις γ) Δεσμώσις δ) Διχοτόμησις ε) Ἀνωμαλίαι τῶν φύλλων κλπ.

Μεταξὺ τῶν μέχρι σήμερον μὴ προσδιωρισμένων συμπτωμάτων σημειώνομεν μίαν ἀνωμαλίαν τοῦ βότρυος ἐμφανισθεῖσαν εἰς δύο ἀμπελώνας.

Οἱ εἰς τῶν ἀμπελώνων τούτων εὑρίσκεται εἰς μίαν τοποθεσίαν λεγομένην «Termine Montagna» καὶ συνίσταται ἀπὸ πρέμνα ἥλικας 18—20 ἑτῶν τῶν ποικιλῶν Chiavennasca καὶ Brugnola ἐμβολιασμένων ἐπὶ 420 A.

Ἡ βλάστησις εἰναι μετρία ἡ δὲ παραγωγικότης κανονικὴ ἐν σχέσει μὲ τὴν ποικιλίαν καὶ τὴν ζώνην.

Οἱ ἔτερος ἀμπελῶν εὑρίσκεται εἰς τὴν τοποθεσίαν «Visciastros» εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ζώνης «Dell Grumello» συνιστάμενος ἐκ πρέμνων ἥλικας 35 περίποτε ἑτῶν ποικιλίας Chiavennasca ἐμβολιασμένων ἐπὶ 420 A.

Οἱ ἀμπελῶν οὗτος εὑρίσκεται ἀκόμη ἐν τοῖς δύο ὄροις καλῆς εὐρωστίας καὶ παραγωγικότητος.

Εἰς ἀμφοτέρους τοὺς ἀμπελῶνας δὲ μολυσματικὸς ἔκφυλισμὸς εἰναι ἀρκετὸς διαδεδομένος μὲ ποικιλά συμπτώματα.

Οἱ παρατηρήθεντες δύναμαι βότρυες εἰναι διαστάσεων πολὺ κατωτέρων τῶν κανονικῶν. Τὸ μῆκος τοῦ βότρυος ἀνέρχεται κατὰ μέσον δροῦ εἰς 75 M.M. περίπου.

Αἱ ράγες εἰναι ἀπύρηνοι, διαμέτρου ποι-