

Διὰ τὴν ποιοτικὴν κατάταξιν καὶ σύγκρισιν τοῦ ἐμπερευσίμου σταφιδωκόπου, βάσις τοῦ μεγέθους τῆς ραγδὸς αὐτοῦ, ἐλήφθησαν ὑπὲρ ὅψιν αἱ ἐν τῷ ἐμπορίῳ ισχύουσαι σήμερον ἐμπορικαὶ σταθεραὶ ήτοι: α) Γουλὸν (Bold) προϊὸν διερχόμενον ἀπὸ κόσκινον No 11 (θιάμετρος ὅπῆς 8,36 χιλσμ.) ἀλλὰ συγκατούμενον ὑπὸ τοιούτου No 12 (ὅπὴ 8 χιλσμ.) β) Μέτριον (Medial) προϊὸν διερχόμενον ἀπὸ κόσκινον No 12 ἀλλὰ συγκατούμενον ὑπὸ τοιούτου No 14 (ὅπὴ 7,30 χιλσμ.) γ) Ψιλὸν (Small) προϊὸν διερχόμενον ἀπὸ κόσκινον No 14 καὶ μὴ διερχόμενον ἀπὸ τοιούτον No 24.

\*Η μακροσκοπικὴ καὶ δργανοληπτικὴ ἔξετασις τοῦ ἔηροῦ σταφιδοκάρπου παρουσιάσει τὰ ἔξῆς:

α) Σχῆμα ραγδῶν: Αἱ ράγες διετήρησαν τὸ σχῆμα τῶν ραγῶν τῆς χλωκῆς σταφυλῆς, ητοι αἱ ράγες τῆς χαραγῆς διετήρησαν τὸ στρογγύλον σχῆμα, αἱ δὲ τοῦ γιβερελλικοῦ καλίου τὸ δώσιδες τοιοῦτον.

β) Πινειάνεια ραγδῶν: Αὕτη ἡτο περισσότερον ρυτιδωμένη, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς μεγάλης διαμέτρου τῆς ραγδὸς, εἰς τὸ προϊὸν τοῦ γιβερελλικοῦ καλίου, ἔναντι τοῦ προϊόντος τῆς χαραγῆς (χαρακτήρι προϊόντος σκιάς).

γ) Χρώμα: Τοῦτο ἡτο περισσότερον κυανομέλλαν εἰς τὸν σταφιδόκαρπον τοῦ Gibrel, παρὰ εἰς τὸν τοιούτον τῆς χαραγῆς. Εἳς ἄλλου καὶ ἡ περιεκτικότης τούτου εἰς ράγας ἐρυθρὰς ἡτο μικροτέρα τοῦ σταφιδοκάρπου τῆς χαραγῆς.

δ) Άφη: 'Ο σταφιδόκαρπος τοῦ Gibrel, φωύδενος διὰ τῶν χειρῶν, παρουσιάζετο περισσότερον τραχὺς τοῦ προϊόντος τῆς χαραγῆς.

ε) Άπομισχωσις: 'Ο μίσχος τοῦ σταφιδοκάρπου τοῦ Gibrel ἀπεσπάτο εὔκολώτερον τοῦ τοιούτου τῆς χαραγῆς, χωρὶς νὰ φέρῃ μαζὶ του σάρκαν καὶ χωρὶς νὰ σχηματίζῃ ἐπὶ τῆς ραγδὸς οὐλήν.

στ) Γεύσις: Αὕτη ἡτο καλυτέρα καὶ γλυκυτέρα εἰς τὸ προϊὸν τοῦ Gibrel παρὰ εἰς τὸ προϊὸν τῆς χαραγῆς.