


Ποσοστά % ἑγγιγμάτων Ραγῶν



Ἐπαναλήψεις

Ἐκ τῆς στατιστικῆς ἀναλύσεως τοῦ πίνακος V προκύπτει, ὅτι τὸ Gibrel ἐπέδρασεν ἀνασχετικῶς ἐπὶ τῆς ἐμφανίσεως ἐγγιγμάτων ραγῶν, προκαλέσαν μείωσιν τοῦ ποσοστοῦ τούτων, ἐν συγκρίσει μετὰ τὴν χαραγὴν, κυμαινομένην ἀπὸ 74—94 ο/ο καὶ ὅτι μεταξὺ τῶν ἐπεμβάσεων διὰ Gibrel δὲν παρατηρήθη σημαντικὴ διαφορά, ὡς πρὸς τὸ ποσοστὸν μειώσεως τῶν ἐμπυρνήτων ραγῶν.

ΠΙΝΑΞ VI

Ἐμφαινῶν τὸ ποσοστὸν ο/ο σακχάρου εἰς τὸ γλεῦκος

Ἀντικείμενα	Ἐπαναλήψεις (ὁμάδες)						Σύνολα	Μ. ὅρος	Διαφορὰ ἑναντι μάρτυρος
	I	II	III	IV	V	VI			
Χ	25.9	25.5	28.4	29.1	26.6	29.0	164.5	27.6	—
ψ₁	24.3	29.0	27.9	24.2	25.8	29.1	160.3	26.7	-0.9
ψ₂	21.2	23.4	22.3	26.8	26.3	25.1	145.1	24.1	-3.1
ψ₃	24.3	23.5	24.5	25.1	26.1	27.8	151.3	25.2	-2.4
Σύνολ.	95.7	101.4	103.1	105.2	104.8	111.0	621.2		

Γενικὸς μέσος ὅρος 25.9

M ο/ο = 2.46