

Ἐκ τοῦ ἀνωτέρω πίνακος ἐξάγεται ὅτι ἡ χρησιμοποίησις τοῦ γιββερελλικοῦ καλίου προεκάλεσεν αὐξησιν τοῦ ξηροῦ προϊόντος, εἰς μὲν τὸ ἀντικείμενον Ψ_1 κατὰ 17,8 ο/ο, εἰς δὲ τὸ Ψ_2 83,23 ο/ο, ἕναντι τῆς χαραγῆς.

Π Ι Ν Α Κ Η XII

Ἐμφαίνων τὴν ἑκατοστιαίαν σύνθεσιν τοῦ ξηροῦ σταφιδοκάρπου [βάσει τοῦ μεγέθους τῆς ῥαγῆς

Σταφιδόκαρπος διερχόμενος ἐξ ἑκάστου Νο κοσκίνου (ποσοστὸν ο/ο)

Ἀντικείμενα	Ἐ π α ν α λ ῆ ψ ε ι ε ς						Μέσος ὀρος
	I	II	III	IV	V	VI	
Κόσκινα: Νο	Κόσκινα: Νο	Κόσκινα: Νο	Κόσκινα: Νο	Κόσκινα: Νο	Κόσκινα: Νο	Κόσκινα: Νο	Κόσκινα: Νο
16 14 12 11 9	16 14 12 11 9	16 14 12 11 9	16 14 12 11 9	16 14 12 11 9	16 14 12 11 9	16 14 12 11 9	16 14 12 11 9
X 11 38 47 4	— 18 58 24	— 9 54 33 4	— 9 48 40 3	— 14 41 40 2	3 7 69 24	— 11 51 35 2	1
Ψ_1 2 11 43 15 29	4 25 54 6 11	6 22 41 13 18	8 25 39 14 14	7 24 43 12 14	9 27 46 9 9	6 20 44 10 10	10
Ψ_2 1 7 40 14 39	2 16 54 16 12	2 8 32 20 38	— 9 38 15 38 1	8 37 16 38	— 7 36 16 41	1 9 40 16 34	34