

III. Μετεωρολογικά δεδομένα κατὰ τὴν περίοδον τῆς ἀνθήσεως καὶ φαινολογικαὶ παρατηρήσεις.

Ἡμερομηνία	Μέση Θ)α	Ἡμερησία ὕγρασ ο)ο	Βροχὴ εἰς m. m.	Φαινολογικαὶ Παρατηρήσεις
17 Μαρτίου				*Εναρξίς βλαστήσεως
15 Μαΐου	22.8	79.0	—	
16 »	22.4	67.5	—	
17 »	23.0	70.5	—	
18 »	19.6	84.0	—	
19 »	19.4	84.0	—	*Εναρξίς ἀνθήσεως
20 »	18.4	84.0	—	
21 »	18.6	87.0	6	
22 »	19.0	91.0	—	
23 »	19.7	94.0	—	Πλήρης ἀνθίσις
24 »	23.6	79.5	—	Χαραγὴ εἰς ὑπόλ. κτῆμα
25 »	23.4	80.0	—	
26 »	23.4	84.5	—	
27 »	24.4	75.0	—	
28 »	25.2	66.0	—	5 ἡμέρας μετὰ πλήρη ἀνθίσις.
29 »	12.6	88.5	—	
30 »	23.4	85.0	—	
31 »	24.6	72.0	—	
1 Ἰουνίου	26.4	67.0	—	
2 »	24.8	80.5	—	
3 »	24.8	82.5	—	10 ἡμέρας μετὰ πλήρη ἀνθίσις.
4 »	24.0	84.5	—	
5 »	23.6	88.0	—	
1-10 Ἰουλίου				*Ἐπίσχεσις τῆς βλαστήσεως
21 Αὐγούστου				Ἵρίμανσις—Τρυγ. πειράμ.

IV. Παρατηρήσεις γινόμεναι κατὰ τὴν περίοδον μέχρι τοῦ τρυγητοῦ

Κατὰ τὴν μέχρι τῆς ὠριμάνσεως περίοδον ἐγένοντο παρατηρήσεις εἰς τὰς δύο πρώτας ἐπαναλήψεις καὶ εἰς τὰς 21 Ἰουνίου καὶ 12 Ἰουλίου 1958. Αἱ παρατηρήσεις αὗται ἦσαν γενικῆς φύσεως καὶ ὑποκειμενικῆς ἐκτιμῆσεως. Αἱ παρατηρήσεις τῆς 21-6-58 συνοψίζονται κατ' ἀντικείμενον ὡς κατωτέρω :

Ἄριθμός  
Ἄντικ.

Π α ρ α τ η ρ ῆ σ ε ι ς

1. Καρπόμεσις καλή. Ράγες ἰσομεγέθεις ἐπὶ τῆς αὐτῆς σταφυλῆς, μετὰ σταφυλῶν διαφόρου μεγέθους ραγῶν. Ἄγιγαρτοι καὶ αἱ «γουλαι» ράγες.
2. Καρπόμεσις καλή. Ράγες μετρίου μεγέθους με διάσπαρτες χονδράδες.
3. Καρπόμεσις καλή. Ράγες μετρίου μεγέθους με διάσπαρτες χονδράδες.
4. Καρπόμεσις μετρία. Ράγες μικροῦ μεγέθους, ἀγίγαρτοι.
5. Καρπόμεσις καλή. Ράγες μικροῦ μεγέθους, ἀγίγαρτοι.