

6. Καρπόδεσις μετρία. Ράγες λίαν μικροῦ μεγέθους, ἰσομεγέθεις με διάσπαρτες «χονδράδες».
7. Καρπόδεσις πολὺ καλή. Σταφυλαὶ ἀνεπτυγμέναι. Ράγες μετρίου μεγέθους ἕως «γουλαί». Μικρὰ ἀνισορραγία. Αἱ «γουλαί» ράγες ἀγίγαρτοι.
8. Καρπόδεσις καλή. Βοτρύδια τινὰ ἀπεξηραμένα. Ράγες μετρίου μεγέθους ἕως «γουλαί». Ράγες ἀγίγαρτοι.
9. Καρπόδεσις κακή. Χαραγὴ οὐχὶ κλεισμένη εἰσέτι. Σταφυλαὶ καὶ βοτρύδια ἀπεξηραμένα. Παρατηροῦνται πολλοὶ «σχοινοκάρποι» ράγες, λόγῳ ἐντόνου ἀνισορραγίας (Millerandage).
10. \*Ἐντονος ἀνισορραγία (Millerandage) μετὰ πολλὰς ὑπερμεγέθεις ράγας ὡς καὶ «σχοινοκάρπους» τοιαύτας. Συμπτώματα ζιζανιοκτόνου εἰς τὰ φύλλα. Καὶ αἱ μετρίου μεγέθους ράγες, ἐγγίγαρτοι.
11. \*Ἐντονος ἀνισορραγία. Καὶ αἱ μετρίου μεγέθους ράγες, ἐγγίγαρτοι.
12. \*Ἐντονος ἀνισορραγία. Συμπτώματα ζιζανιοκτόνου εἰς τὰ φύλλα. Καὶ αἱ μικροῦ μεγέθους ράγες, ἐγγίγαρτοι.
13. \*Ἐντονος ἀνισορραγία. \*Ἐντονα συμπτώματα ζιζανιοκτόνου εἰς τὰ φύλλα. Καὶ αἱ μικροῦ μεγέθους ράγες, ἐγγίγαρτοι.
14. \*Ἐντονος ἀνισορραγία. Ἐλαφρὰ συμπτώματα ζιζανιοκτόνου εἰς τὰ φύλλα. Καὶ αἱ μικροῦ μεγέθους ράγες, ἐγγίγαρτοι.
15. Καρπόδεσις μετρία ἕως κακή. Μετρία ἀνισορραγία. Ἐλαφρὰ συμπτώματα ζιζανιοκτόνου εἰς τὰ φύλλα. Ράγες μεγέθους ἄνω τῶν 8 χιλ. διαμέτρου, ἐγγίγαρτοι.
16. Καρπόδεσις κακίστη, μετὰ σταφυλὰς μετὰ ξηρῶν βοτρυδίων. \*Ἐντονος ἀνισορραγία μετὰ πολλὰς «σχοινοκάρπους» ράγας καὶ διασπάρτους κανονικὰς τοιαύτας.  
Αἱ παρατηρήσεις τῆς 12-7-58 συνοφίζονται κατ' ἀντικείμενον ὡς κατωτέρω :
1. Ράγες «γουλαί» καὶ ψιλαί. Αἱ ψιλαὶ ράγες εἶναι καθυστερημένης ὠριμάνσεως. Ράγες ἐρυθραὶ 25 ο)ο (ἔναρξις ὠριμάνσεως). Ράγες ἀγίγαρτοι.
2. Σταφυλαὶ ἀνομοιομόρφου μεγέθους ραγῶν. Διάμετρος ραγῶν, 9,5-11 χιλ. Ράγες ἐρυθραὶ, 20-40 ο)ο. Ράγες ἀγίγαρτοι.
3. Αἱ μικραὶ ράγες, διαμέτρου 7-9 χιλ., εἶναι καθυστερημένης ὠριμάνσεως, ἐνῶ αἱ «γουλαί» τοιαῦται, διαμέτρου 7-11 χιλ., εἶναι προηγμένης ὠριμάνσεως (ἐρυθραὶ). Ράγες γενικῶς ἀγίγαρτοι, πλὴν χονδράδων τινῶν, διαμέτρου 11-13 χιλ., ἐγγιγάρτων καὶ καθυστερημένης ὠριμάνσεως. Ράγες ἐρυθραὶ, 30 ο)ο.
4. Ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ πρέμνου σταφυλαὶ ψιλόρραγες καὶ «γουλαί». Ράγες ἀγίγαρτοι. Ράγες ἐρυθραὶ, 20 ο)ο.
5. Μικρὰ ἀνισορραγία μετὰ ράγας ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ψιλόρραγους. Ράγες «γουλαί», προηγμένης ὠριμάνσεως (ἐρυθραὶ) 15-30 ο)ο Ράγες ἀγίγαρτοι.
6. Σταφυλαὶ πολὺ ψιλόρραγες. Ράγες ἐρυθραὶ, 0-2 ο)ο. Ράγες ἀγίγαρτοι.
7. Σταφυλαὶ πυκνόρραγες καὶ πολὺ «γουλαί». Ποσοστὸν 15-25 ο)ο τῶν ραγῶν, χρώματος ροδίνου ἕως ἐρυθροῦ καὶ διαμέτρου 11-13 χιλ. εἶναι προηγμένης ὠριμάνσεως καὶ ἀγίγαρτοι. Αἱ ὑπόλοιποι ράγες