

καί τήν μορφήν τῶν σχηματιζομένων εἰς ἐκάστην περίπτωσιν γιγάρτων, ἐγένετο κατάταξις τῶν ἐγγιγάρτων ραγῶν συναρτήσῃ τῶν δύο ὡς ἄνω πα-
ραγόντων.

Ἡ κατάταξις τῶν γιγάρτων ὡς πρὸς τὸ μέγεθος καὶ τήν διαμόρφωσιν τῶν ἐγένετο ἐπὶ τῇ βράσει κλίμακος καθορισθείσης ὑπὸ τοῦ κ. Μ. Ν. Ἀναγνωστοπούλου, περιλαμβανοῦσης 6 κατηγορίας γιγάρτων, τὰ Νο 1 Νο 2, Νο 3, Νο 4, Νο 5 καὶ Νο 6. Ἐκ τούτων τὸ Νο 1 ἀφορᾷ ὑποτυπώδη γί-
γαρτα, τὸ Νο 6 γίγαρτα πλήρως διαμορφωμένα καὶ με ἐνδιάμεσον κατάτα-
ξιν τῶν ὑπολοίπων κατηγοριῶν (βλ. εἰκ. 1).

Εἰς τὸν πίνακα γ δίδεται τὸ ἐπὶ τοῖς ο)ο ἐγγιγάρτων ραγῶν, ἀναλο-
γούν ποσοστὸν ραγῶν με 1, 2, 3, 4, 5, 6 καὶ 7 γίγαρτα, κατὰ ἀντικείμενον. Τὸ ἀναγραφόμενον ποσοστὸν ἀναφέρεται εἰς τὸν μέσον ὅρον τεσσάρων ἐπα-
ναλήψεων κατὰ ἀντικείμενον.

Κατανέμοντες τ' ἀντικείμενα ἐρεύνης εἰς δύο ὁμάδας, ἤτοι εἰς τὰ μετὰ
φυτομόνης καὶ εἰς τὰ ἄνευ φυτομόνης καὶ λαμβάνοντες ἐκ τοῦ πίνακος γ
τὸ ἀντιστοιχοῦν μέσον ποσοστὸν ραγῶν 1-7 γίγαρτα κατὰ ράγα, σχημα-
τίζομεν τὸ ὑπ' ἀριθ. 1 διάγραμμα. Τὸ ἀντικείμενον 16 δὲν συμπεριελήφθη
εἰς τὴν ὁμάδα τῶν μετὰ φυτομόνης ἀντικειμένων λόγω διαφόρου συμπερι-
φορᾶς τούτου ἐν σχέσει πρὸς τὴν ὁμάδα ταύτην.

Π Ι Ν Α Κ Σ Ι Ι

Ἐμφαίνων τὸ σάκχαρον τοῖς ο)ο χλωρὰς σταφίδος καὶ τὸ μέσον βάρος
ξηρὰς σταφίδος κατὰ σταφυλὴν

Ἀριθμὸς ἀντικειμ.	Σ ά κ χ α ρ ο ν ο)ο			Μέσον βάρος κατὰ στοφυλὴν εἰς γρομ.		
	Ἐ π α ν α λ ή ψ ε ι ς			Ἐ π α ν α λ ή ψ ε ι ς		
	Γ	Δ	Μ. ὅρος	Γ	Δ	Μέσος ὅρος
1	23,0	22,0	22,5	39,2	38,3	38,75
2	23,0	20,5	21,75	42,1	35,9	39,00
3	20,5	22,5	21,5	34,5	37,1	35,80
4	22,0	24,0	23,0	31,8	32,5	32,15
5	24,0	22,0	23,0	34,5	31,0	32,75
6	24,5	22,5	23,5	28,9	31,5	30,20
7	23,0	24,0	23,5	44,0	44,9	44,45
8	25,0	23,5	24,25	44,4	38,4	41,40
9	24,0	25,0	24,5	23,3	29,8	26,55
10	26,0	26,0	26,0	23,1	24,5	23,80
11	27,0	25,0	26,0	28,7	26,3	27,50
12	25,0	24,5	24,75	26,4	29,8	28,10
13	26,5	26,0	26,25	28,0	35,9	31,85
14	25,5	26,5	26,0	23,0	22,7	22,85
15	27,0	26,0	26,5	33,8	36,5	35,15
16	28,0	25,0	26,5	21,4	28,4	24,90

Σ. Σ. Δ διὰ $P=0,05$ 2,32

Σ. Σ. Δ διὰ $P=0,05$ 6,24