

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ  
ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ



### ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Κατά τὸν μῆνα Ἀπρίλιον ἐγένοντο ἡ ὑποστύλωσις, τὸ σκάλισμά καὶ οἱ δύο—τρεῖς πρώτοι κατὰ τοῦ περονοσπόρου ψεκασμοὶ τῆς σταφίδαμπέλου.

Ἡ ἀπασχόλησις τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ ἦτο (καὶ διὰ τῶν λοιπῶν καλλιεργειῶν) σχεδὸν πλήρης. Τὰ ἡμερομίσθια ἐκυμάνθησαν εἰς συνήθη ἕως ὑψηλὰ ἐπίπεδα.

Ἡ βλάστησις τῆς σταφίδαμπέλου ἦτο κανονικὴ, εὐνοουμένη ὑπὸ τῶν σχετικῶς ὑψηλῶν θερμοκρασιῶν καὶ τῶν πλουσιῶν βροχοπτώσεων.

Αἱ συνεχεῖς ὅμως βροχοπτώσεις ἠνάγκασαν τοὺς καλλιεργητὰς ὅπως πυκνώσουν τοὺς ψεκασμοὺς κατὰ τοῦ περονοσπόρου.

Ἡ προσβολὴ τοῦ περονοσπόρου εἶναι ἀσήμεντος ἀπὸ οἰκονομικῆς πλευρᾶς. Πλὴν ὅμως δίδει ἀρχὴν περαιτέρω πολλαπλασιασμοῦ τούτου.

Εἰς τινὰς θέσεις τῆς σταφιδοφόρου περιοχῆς ἐπροξενήθησαν ἀξιόλογοι ζημίαι ἐκ πτώσεως χαλᾶζης.

Ἡ παραγωγὴ ἀπὸ ἀποψιν ἀριθμοῦ καὶ μεγέθους σταφυλῶν προβλέπεται ἡδύξημένη ἔναντι τοῦ 1959.

### ΜΑΪΟΣ

Κατὰ τὸν μῆνα Μάϊον ἐγένετο ἡ καταπολέμησις τοῦ περονοσπόρου διὰ 2—3 ψεκασμῶν ὡς καὶ ἡ καταπολέμησις τοῦ οἰδίου διὰ δύο θειώσεων.

Ἡ καταπολέμησις ἀμφοτέρων τῶν ἀσθενειῶν (περονοσπόρου καὶ οἰδίου) ὑπῆρξε ἐπιτυχής.

Αἱ ὑπ' αὐτῶν προξενηθεῖσαι ζημίαι δὲν εἶναι ἄξια λόγου.

Ἡ ἀπασχόλησις τῶν ἐργατικῶν χειρῶν κατὰ τὸν ἐν λόγῳ μῆνα ἦτο ὑψηλὴ, ὑπο-

λογιζομένης καὶ τῆς τοιαύτης διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς χαραγῆς. Τὰ ἡμερομίσθια ἐκινήθησαν μᾶλλον εἰς ὑψηλὰ ἐπίπεδα.

Ἡ βλάστησις τῆς σταφίδαμπέλου, εὐνοουμένη ὑπὸ τῶν καιρικῶν συνθηκῶν, ἐξηλίχθη κανονικῶς.

Ἡ παραγωγὴ προβλέπεται ὑψηλοτέρα τῆς περυσινῆς τοιαύτης κατὰ ποσοστὸν 20 ο)ο.

### ΙΟΥΝΙΟΣ

Μετὰ τὴν ὀλοκλήρωσιν τῆς ἀνθήσεως τῶν σταφιδοφυτειῶν καὶ εἰς τὰς ὄρεινὰς περιοχὰς κατὰ τὰς πρώτας ἡμέρας τοῦ Ἰουνίου, τῇ βοηθειᾷ τῆς χαραγῆς συνετελέσθη ἡ καρπόδεσις καὶ ἡ ἀνάπτυξις τοῦ μεγέθους τῶν ραγῶν.

Ἡ ἔλλειψις βρογῶν καὶ αἱ μέτρια θερμοκρασίαι αἱ σημειωθεῖσαι κατὰ τὴν περιόδον τῆς χαραγῆς καὶ μετὰ ταύτην συνετέλεσαν εἰς τὴν ἱκανοποιητικὴν συγκράτησιν καὶ ἀνάπτυξιν τῶν ραγῶν.

Εἰς πολλὰς περιφερείας ὅπου δὲν ἐγένοντο ἐγκαίρως οἱ ψεκασμοὶ τῶν σταφίδαμπέλων παρατηρήθη εἰς εὐρείαν ἔκτασιν ὀψιμος προσβολὴ περονοσπόρου ἐπὶ σταφυλῶν καὶ φύλλων.

Ἐπιπλέον παρατηρήθησαν περιορισμένως προσβολαὶ οἰδίου.

Ἡ βλάστησις ὑπῆρξε ζωηρὰ καὶ ἐσνεχίσθη μέχρι τέλους τοῦ μηνός.

Ἐνάρξεις γυαλισματός καὶ χρώσις τῶν σαγῶν ἐσημειώθη τὸ τελευταῖον 10ῆμερον τοῦ μηνός.

Αἱ μέχρι τοῦδε ἐνδείξεις φέρουν ὡς προαιμωτέρα τὴν ὀρίμανσιν κατὰ 2—7 ἡμέρας ἔναντι τοῦ παρελθόντος ἔτους.

Ἡ παραγωγὴ γενικῶς εἶναι ἡδύξημένη κατὰ 13—15 ο)ο ἔναντι τῆς τοῦ παρελθόντος ἔτους.

(Ἐκ τοῦ Γεωργικοῦ Γμήματος ΑΣΟ)