

χρόνον, ήτοι 3 ημέρας μετά τήν πλήρη άνθησην.

Πασύτως, έδοκιμάσθη, ή αύτη δόσις γιββερελλικού καλίου εἰς ἀπλῆν, διπλῆν καὶ τριπλῆν ἐπέμβασιν εἰς διάφορα χρονικὰ διατήματα (ἀνά 7ήμερον, ἀνά 12ήμερον) μετά τὴν πλήρη ἀνθήσην καὶ καρπόδεσιν τῆς σταφιδαμπέλου.

Οἱ ἀποληφθεῖς σταφιδόκαρπος διὰ τῆς χρήσεως γιββερελλίνης τῶν ὡς δύο πυκνοπήγων ἡτο γουλὸς ἔως ὑπέργυλος.

Σκοπός — Κατάστρωσις — Ἐγκατάστασις Πειραμάτων κατὰ τὸ 1960.

Ἀντικειμενικὸς σκοπὸς τῶν διεξαγθέντων πειραμάτων κατὰ τὸ τρέχον ἔτος διὰ τῆς χρησιμοποίησεως τοῦ γιββερελλικού καλίου *vibet* ἡτο :

1) Ἡ ἀντικατάστασις τῆς χαραγῆς τῆς σταφιδαμπέλου.

2) Ἐξασφάλισις σταφιδοκάρπου ἀπηλλαγμένου ἐγγιγάρτων ραγῶν.

3) Ἐξασφάλισις ξηροῦ προϊόντος, συμφένων πρὸς τὰς ἀταυτήσιτες τῆς καταναλώσεως, φύλου πρὸς μέτριον, δηλαδὴ ἀπὸ Νο 18—Νο 12 ἡ μᾶλλον ἀνταποκρινομένου πρὸς τὰς ἔκαστατες ἐμπορικὰς ἀπαιτήσεις.

4) Ἀποκόμισις τούλαχιστον τῆς αὐτῆς πούστητος ξηροῦ σταφιδοκάρπου μὲ κόστος παραγογῆς μικρότερον ἡ τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου πρὸς τὸ ἐκ χαραγῆς προεργάμενον.

Πέρὸς τοῦτο, ἐν τῇ τοῦ οἴκου τοῦ Σταφίδος Κοκκινού—Κορινθίας ὑπαρχούσης φυτείας Κορινθικῆς σταφίδος, ὡς καὶ τὸν σταφιδοφετίου τῶν γεωργοκτηματιῶν Λ. Βουρζοπούλου καὶ Ἀρ. Καρβούνη περιοχῆς Κακκινού—Βέλλου, ἐπελέγησαν ἐξ ἔκαστης 90 πειραματικὰ πρέμινα, κατανεμηθέντα εἰς 5 ὄμάδας, δύος καὶ αἱ ἐπαναλήψεις. Ἐκκόπη ὄμάς (ἐπαναλήψις) περιελάμψη 6 πειραματικὰ τεμάχια (ύστα καὶ τὰ ἄλλα μελέτην ἀντικείμενα) διαταραμένα τυχόντας ἐντὸς αὐτῆς. Ἐκαστον δὲ πειραματικὸν τεμάχιον ἀποτελεῖτο ἐκ 3 πρέμινων τριῶν 3 πρέμινα X 6 ἀντικείμενα X 5 ἐπαναλήψεις=90 πρέμινα).

Επιδιότερον, ἔδοκιμάσθη, εἰς τὰ ἐν λόγῳ πειραματικὰ ἡ ἐπίδρασις διαφόρων δόσεων γιββερελλίνης καὶ δὴ 0,5, 1, 1,5, 2,5 ριπ., 5 ρριπ. καὶ 7,5 ριπ., εἰς ἀπόλυτην ἐπέμβασιν (ένχες φεκασμὸς) εἰς τὸ αὐτὸν χρονικὸν διάστημα, ήτοι 3—5 ημέρας μετά τὴν πλήρη ἀνθήσην (κρέμασθε τὸ σταφίδιο). Η χρησιμή (μάρτυς) ἐγίνετο δακτυλική, ἐπίσης 3—5 ημέρας μετά τὴν πλήρη ἀνθήσην.

Οἱ προσκολλητὴ καὶ οὐσία ἐγρηγοριμοποιήθη

τὸ Tide εἰς ἀναλογίαν 1 γραμμάριον ἀνὰ λίτρον ὅδατος.

Οἱ φεκασμοὶ ἐπὶ τῶν σταφυλῶν ἐγένετο διὰ κοινοῦ ἐπινωτίου ἀμπελουργικοῦ φεκαστήρος (ψιλὴ δακτυλήθρα) 3—5 ημέρας μετά τὴν πλήρη ἀνθήσην. Κατεβλήθη δὲ πρὸ σπάσια δύο ως: α) διαβρωστικῶς ὅλαις αἱ σταφυλαὶ ἐκ τοῦ πρέμου καὶ β) διαβρωστικῶς ἡ τοῦ πρέμου καὶ αἱ σταφυλαὶ μεταξύ τῶν ἐγένετο τελείωσις.

Τὰ πειραματικὰ πρέμινα ἔτυχον ἀνεξαρέσεως τῶν συνήθων καλλιεργητικῶν φροντίδων, ἐκτὸς τῆς χαραγῆς συμφώνως πρὸς τὸ πειραματικὸν σχέδιον.

Παρατηρήσεις μέχρι τοῦ τρυγητοῦ.

Τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τῶν κλιματολογικῶν συνθηκῶν τῆς καλλιεργητικῆς περιόδου 1960 ἦσαν αἱ ἄρθροναι καὶ συνεχεῖς βροχοπτώσεις ἀπὸ 25—31 Μαΐου (βροχὴ 3 οἱ iii iii) δηλαδὴ τὴν ἐποχὴν καθ' ἣν ἐκτελεῖται συνήθως ἡ χαραγὴ εἰς τὴν πεδινήν καὶ Ἡμιορεινήν Κορινθίαν καὶ αἱ συνεχεῖς ἐπὶ 4ημέρους βροχοπτώσεις (15—18 'Ιουνίου) ἐποχὴ δηλαδὴ καθ' ἣν ἐκτελεῖται ἡ χαραγὴ εἰς τὴν ὄρεινήν Κορινθίαν (Κλημέντι).

Μετὰ 7—10 ημέρας περίπου ἀπὸ τοῦ φεκασμοῦ αἱ σταφυλαὶ αἰτινες είχον ὑποστῆ τὴν ἐπίδρασιν τῆς γιββερελλίνης πυκνότητος 2,5 ριπ., 5 ριπ. καὶ 7,5 ρριπ. ἐσημείωσαν λίαν ἐκδηλών διαφοράν αὐξήσεως τοῦ μεγέθους τῶν ραγῶν συγκριτικῶν πρὸς τὰς σταφυλάς αἱ ὄποιαι είχον ὑποστῆ τὴν ἐπίδρασιν τῆς χαραγῆς. Ἐν συνεχείᾳ ἐσημείωσαν λίαν κατὰ τὴν περίοδον τοῦ παραδιλατισμάτος καὶ ἐντεῦθεν.

Κατ' ἀρχὴν παρετηρήθη διάφορος ἀντίδρασις εἰς τὴν ἐπίδρασιν τῆς γιββερελλίνης εἰς ώρισμένα πρέμινα συνήθως ζωηρά, εἴτε λόγω διαφοράς ἡλικίας, εἴτε λόγω τῶν παραγόντων τοῦ πειριβάλλοντος καὶ δὴ τῶν κλιματολογικῶν, οἵτινες ἐπεκράτησαν.

Τέλος εἰς σταφιδοφυτείκας μικρᾶς ἡλικίας (Νεμέα) μέχρι 10—15 ἑτῶν, ὡς καὶ νεοφυτεύματα μεχρι 3—4 ἑτῶν (δὲν ἔχουν ὑποστῆ ἀκόμη χαραγὴ) παρετηρήθη λίαν ἐκδηλώσεις καὶ ἀκανόνιστος ἡ ἀντίδρασις τῶν σταφυλῶν εἰς τὴν ἐπίδρασιν τῆς γιββερελλίνης τόσον ἀπὸ πρέμινον εἰς πρέμινον, δύον καὶ μεταξὺ τῶν σταφυλῶν τοῦ αὐτοῦ πρέμινον, μὲ τελικὸν ἀποτέλεσμα νχ ἐμφανίζεται λίαν ἀντιληπτὴ διαφορὰ πρέμινον, ὡς καὶ σταφυλιν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ πρέμινον.

Εἰς πειρατώσεις τινάς, εἰς νεοσταφιδοφυτείκας 3—4 ἑτῶν (δὲν ἔχουν χαρακωθεῖ ἀκόμη), οὐδεμία ἀντίδρασις τῶν σταφυλῶν παρετηρήσκειν εἰς τὴν ἐπίδρασιν τῆς γιββερελλίνης 2,5—4 ριπ. (εἴτινας τὰς σταφυλάς των).