

Τρυγητός — Αποξήρανσις

Ὁ τρυγητός ἦτο ταυτόχρονος καὶ καθολικός δι' ὅλα τὰ ἀντικείμενα.

Ἡ συγκομισθεῖσα χλωρὰ σταφίς ἀπεξηράνθη εἰς τὸν ἥλιον κεχωρισμένως κατὰ ἀντικείμενον, ἐπὶ ἁλωνίου ἐκ σκυροκονιάματος.

Ἡ διάρκεια τοῦ χρόνου ἀποξηράνσεως ἦτο 10 ἡμέραι διὰ τὰ ἀντικείμενα γιββερελλίνης 0,5 ppm καὶ γιβ. Ι ppm, διὰ τὰ

ἀντικείμενα χαραγὴ καὶ γιββερελλίνης 2,5 ppm 11 ἡμέραι καὶ διὰ τὰ ἀντικείμενα γιββερελλίνης 5 ppm καὶ γιββερελλίνης 7,5 ppm 13 ἡμέραι.

Ὁ συλλεγείς ξηρὸς σταφιδόκαρπος, μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ ἐκ τῶν βοστρύχων, μετεφέρθη ἐν τῷ σταφιδεργοστασίῳ τοῦ ΑΣΟ εἰς Κιᾶτον διὰ τὸν ποιοτικὸν διαχωρισμὸν βάσει τοῦ μεγέθους τῆς ραγῆς συμφώνως πρὸς τὰ ἰσχύοντα σήμερον ἐμπορικὰ κριτήρια.

**Πείραμα ἀγροκλήματος Παραρτήματος Γεωργικῷ Ἰνστιτούτῳ ΑΣΟ Κοκκωνίου
Γιββερελλίνη 2,5 ppm**

Ποσότης προϊόντος 37,2 Kgs

	Kgs	ι, 5	ἦτοι	ποσοστὸν	4%
1) Ἀπορρίμματα ἐλήφθησαν					5,4%
2) Χονδράδες »	»	2	»	»	11,5%
3) Σίφιτιγξ (No 16—20)	»	4 3	»	»	37,0%
4) Ψιλὸ No 14—15)	»	13, 7	»	»	33,7%
5) Μέτριον (No 12—13)	»	12, 5	»	»	8,4%
6) Γουλὸ (No 11)	»	3, 2	»	»	

Χ α ρ α γ ῆ**Ποσότης προϊόντος 39,7 Kgs**

	Kgs	1,1	ἦτοι	ποσοστὸν	2,80%
1) Ἀπορρίμματα ἐλήφθησαν					8,20%
2) Χονδράδες »	»	3,2	»	»	8,20%
3) Σίφιτιγξ (No 16—20)	»	3,3	»	»	22,30%
4) Ψιλὸ (No 14—15)	»	8,8	»	»	35,70%
5) Μέτριον (No 12—13)	»	14,2	»	»	22,80%
6) Γουλὸ (No 11)	»	9,1	»	»	

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω προκύπτει ὅτι ἡ χαραγὴ ἔδωκεν 58 0/0 ψιλομέτριον προϊόν (No 12—15) καὶ 22,80% γουλὸν (No 11), ἐνῶ εἰς τὴν γιββερελλίνην πυκνότητος 2,5 ppm κυριαρχεῖ ἀπολύτως τὸ ψιλομέτριον

(No 12—15) μὲ 71 0/0 καὶ μόνον 8,4 0/0 γουλὸν (No 11), ὡς ἐπίσης, ὅτι ἡ γιββερελλίνη 2,5 ppm ὑστέρησεν ἀπὸ ἀπόψεως παραγωγῆς ἔναντι τῆς χαραγῆς κατὰ 7 0/0.

Ληφθεὶς σταφιδόκαρπος ἐξ ἀποδεικτικοῦ διὰ χρήσεως γιββερελλίνης 2,5 ppm

Ποσότης ξηροῦ προϊόντος 345 Kgs

	Kgs	2, 5	ἦτοι	ποσοστὸν	6%
1) Ἀπορρίμματα ἐλήφθησαν					4%
2) Χονδράδες »	»	14	»	»	13,5%
3) Σίφιτιγξ No 16—20.»	»	46, 5	»	»	43,5%
4) Ψιλὰ No 14—15 »	»	150	»	»	27%
5) Μέτριον No 12—13 »	»	93	»	»	6%
6) Γουλὸ No 11 »	»	21	»	»	