

Ψέριμος, Νίσυρος, Καστελλόριζον και Ἀστυπάλαια, με τὰς εἰς ταῦτα ὑπαγομένας μικρὰς νησίδας.

Ὡς ἀμόλυντοι, ἐξ ἄλλου, φυλλοξήρας χαρακτηρίζονται ἅπασαι αἱ λοιπαὶ περιφέρειαι τῆς χώρας, αἱ μὴ κατονομαζόμεναι, ὡς ἄνω, ἦτοι: Ἡ Πελοπόννησος ὀλόκληρος μετὰ τῶν παρ' αὐτὴ νήσων, ἡ Κρήτη ὀλόκληρος μετὰ τῶν περίεξ αὐτῆς νησίδων, ἡ Ἐπτάνησος ὀλόκληρος, οἱ νομοὶ Πρεβέζης, Θεσπρωτίας, Ἄρτης, Αἰτωλοακαρνανίας καὶ Φωκίδος ὀλόκληροι, ἐκ τοῦ τοῦ νομοῦ Ἀττικῆς ἅπασαι αἱ εἰς τοῦτο ὑπαγόμεναι νῆσοι πλην τῆς Μα-

κρονήσου, ἡ περιοχή Ἀλῶν (Ζέας) τοῦ λιμένος Πειραιῶς, ἐκ τῆς περιοχῆς Μεγαρίδος ἡ περιοχή ἡ κειμένη νοτίας καὶ νοτιοδυτικῶς τῆς ἐθνικῆς ὁδοῦ Ἐλευσίνος—Θηβῶν καὶ συνορευομένη με τοὺς νομούς Βοιωτίας καὶ Κορινθίας καὶ κόλπους Σαρωνικὸν καὶ Κορινθιακόν. Ὅλαι αἱ νῆσοι τοῦ νομοῦ Κυκλάδων, πλην τῶν: Ἄνδρου, Κέας καὶ Ἀμοργοῦ καὶ τῶν περὶ ταύτης νησίδων, ὡς ἄνωτέρω ἀναφέρονται καὶ ἐκ τῶν Δωδεκανήσων, αἱ νῆσοι: Ρόδος, Τήλος, Κάρπαθος, Σύμη, Χάλκη, Κάσος με τὰς ὑπ' αὐτάς ὑπαγομένας νησίδας.

Γενικὴ ἀνασκόπησις τῆς σταφιδοκαλλιεργείας

Μετεωρολογικὰ Δελτία



ΜΑΪΟΣ

Αἱ ἐπικρατήσασαι ξηροθερμικαὶ καιρικαὶ συνθήκαι κατὰ τὸν μῆνα Μαΐου ἐπῆρξαν, γενικῶς, εὐνοϊκαὶ διὰ τὴν ἐξέλιξιν τῆς σταφιδοκαλλιεργείας.

Ἡ σήμεθεῖσα εἰς τινὰς περιφερείας πτώσις χαλάζης ἦτο περιορισμένης κλίμακος, αἱ δὲ ἐξ αὐτῆς προξενηθεῖσαι ζημίαι (τοπικῆς σημασίας) δὲν ἐπέδρασαν σοβαρῶς ἐπὶ τοῦ ὕψους τῆς καθ' ὅλου παραγωγῆς.

Συνέπεια τῶν εὐνοϊκῶν ξηροθερμικῶν καιρικῶν συνθηκῶν ἦτο καὶ ἡ μὴ ἐμφάνισις μυκητολογικῶν, καὶ ἐντομολογικῶν ἀσθενειῶν.

Αἱ καλλιεργητικαὶ ἐργασίαι καὶ δὴ ἡ χαραγῆ, ἐξετελέσθησαν ὁμαλῶς καὶ κανονικῶς.

Τὸ ὕψος τῆς παραγωγῆς προβλέπεται ἐλαφρῶς μειωμένον ἔναντι τῆς παραγωγῆς τοῦ προηγούμενου ἔτους λόγω τοῦ μικροτέρου ἀριθμοῦ σταφυλῶν.

ΙΟΥΝΙΟΣ

Αἱ ἐπικρατήσασαι καιρικαὶ συνθήκαι κατὰ τὸν μῆνα Ἰούνιον δύνανται νὰ χα-

ρακτηρισθοῦν ὡς εὐνοήσασαι, γενικῶς, τὴν ἐξέλιξιν τῆς σταφιδοπαραγωγῆς. Ἡ σήμεθεῖσα κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ τρίτου δεκαήμερου πτώσις χαλάζης εἰς ὠρισμένας περιφερείας ἐπροξένησε βεβαίως κατὰ τὸ μᾶλλον ἡ ἦττον σοβαρὰς ζημίας εἰς τὰς σταφίδαμπέλους αὐτῶν, πλην ὅμως δὲν δύνανται νὰ θεωρηθοῦν καὶ σοβαρὰ ἐπὶ τοῦ συνόλου τῆς παραγωγῆς.

Ἡ αὐξησις τοῦ μεγέθους τῶν ραγῶν τῶν σταφυλῶν ἐξελίχθη κανονικῶς, συντελεσθεῖσης καὶ τῆς ἐπισχέσεως τῆς βλαστήσεως τῆς σταφίδαμπέλου, ἐνῶ κατὰ τὸ τρίτον δεκαήμερον τοῦ μηνὸς ἤρχισε σποραδικῶς ὁ ψεκασμὸς τῶν σταφυλῶν ὠρισμένων σταφίδαμπέλων.

Προσβολαὶ ἐκ μυκητολογικῶν καὶ ἐντομολογικῶν ἀσθενειῶν δὲν ἐσημειώθησαν εἰς ἀξίον λόγου βαθμόν.

Αἱ μέχρι τοῦδε ἐνδείξεις φέρουν τὴν ὠρίμανσιν τῶν σταφυλῶν ὡς προημιωτέραν τὴν δὲ παραγωγὴν μικροτέραν ἔναντι τῆς περισυνῆς κατὰ 15—20 %.

Ἐκ τοῦ Γεωργικοῦ Τμήματος Α.Σ.Ο.