

## Γενική ἀνασκόπησις ::::: τῆς σταφιδοκαλλιεργείας

## Μετεωρολογικά Δελτία

### ΙΟΥΝΙΟΣ

Χαρακτηριστικὸν τοῦ μηνὸς Ἰουνίου ὑπῆρξεν διὰ ἐπεκράτησαν κατ' αὐτὸν ἔντονοι ξηροθερμικοὶ ἀτμοσφαιρικοὶ συνθῆκαι, αἱ δούοι αἱ ἐπέδρασαν ἀνασχετικῶς τὸσον εἰς τὴν βλάστησην τῆς σταφιδαμπέλου, δσον καὶ εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῶν σταφυλῶν, ίδιως εἰς τὰ ξηρά ἐδάφη, ἐνῷ ἐκ παραλλήλου δὲν ἦνόθησαν τὴν ἐκδήλωσιν καὶ ἀνάπτυξιν τῶν διαφόρων ἀσθενειῶν τῆς σταφιδαμπέλου. Ως ἐκ τούτου εἰς πολλάς περιφερείας αἱ σταφυλαὶ παρέμειναν μικρότεραι καὶ μὲν μικροτέρας ράγιας ἔναντι τοῦ ἀναμενούμενου μεγέθους αὐτῶν (σταφυλαὶ ψιλόδραγες).

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ἡ παραγωγὴ σταφίδος, θά είναι ἀνωτέρα τῆς περυσινῆς γύρω στὰ 20 %, καὶ καλυτέρας ποιότητος.

### ΙΟΥΛΙΟΣ

Καὶ κατὰ τὸν μῆνα Ἰούλιον ἔσυνεχι-  
σθησαν αἱ ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Ἰουνίου ἄρ-  
ξάμεναι ἔντονοι ξηροθερμικοὶ ἀτμοσφαι-  
ρικοὶ συνθῆκαι, αἱ δούοι αἱ ἐπροκάλεσαν  
τὴν ἐμφάνισιν εἰς ἐντονώτερον βαθμὸν—  
ἔναντι τοῦ προηγουμένου ἔτους—τῆς μα-  
ράνισεως τῶν σταφυλῶν κυρίως εἰς τὰς ἡ-  
λικιωμένας καὶ υπερφορτωμένας ἐκ τῆς πα-  
ραγωγῆς σταφιδαμπέλου. Λόγῳ τῶν συνθῆ-  
κῶν τούτων παρέμειναν καὶ αἱ σταφυλαὶ μικρόδραγες, ἔναντι τοῦ ἀναμενούμενου μεγέθους αὐτῶν, προβλέπομένης οὕτω κα-  
λυτέρας ποιότητος σταφιδοκάρπου ἔναντι τῆς τοῦ προηγουμένου ἔτους. Αἱ ἐν λόγῳ  
ἐπίστης συνθῆκαι δὲν ἦνόησαν τὴν ἐμφά-  
νισιν καὶ ἀνάπτυξιν τῶν διαφόρων ζωϊκῶν καὶ φυτικῶν ἀσθενειῶν. Ἡ παραγωγὴ τοῦ Νομοῦ προβλέπεται ἡνημένη κατὰ 17 % περίπου ἔναντι τοῦ προηγουμένου ἔτους.

### ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Αἱ ἐπικρατήσασαι καὶ κατὰ τὸν μῆνα Αὔγουστον ἔντονοι ξηροθερμικοὶ ἀτμο-  
σφαιρικοὶ συνθῆκαι δὲν ἐπέδρασαν εὐ-  
νοϊκῶς εἰς τὴν ὁμαλὴν καὶ κανονικὴν ὠ-



ρίμασιν τῶν σταφυλῶν τῆς σταφιδαμπέλου, ἡτις (ώριμανσις) ἐμφανίζει καὶ καθυστέρησιν ἔναντι τῆς τοῦ προηγουμένου ἔτους κατὰ 5—7 ημέρας. Αἱ συνθῆκαι ὅμως αὗται ἐπέδρασαν εἰνοικῶς εἰς τὴν ἀποξήρανσιν αὐτῶν. Ἡ σημειωθεῖσα πτώσις χαλάζης κατὰ τὸ δεύτερον 150ήμερον τοῦ μηνὸς εἰς ώρισμένας περιφερείας τοῦ Νομοῦ δὲν ἐπροξένησεν ἀξίας λόγου ζημίας ἐπὶ τοῦ ἀνηρτημένου ἡ ἀποξηρανούμενον σταφιδοκάρπου, ἡ ποιότης τοῦ ὅποιον προβλέπεται καλή.

### ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Οἱ μὴν Σεπτέμβριος ἡτο θερμότερος καὶ βροχερότερος τοῦ ἀντιστοίχου τοῦ παρελθόντος ἔτους.

Πάντως δύναται νὰ θεωρηθῇ, ὅτι ἡν-  
νόησε τὴν ὄλοκληρωσιν τοῦ τρυγητοῦ  
τῶν σταφιδαμπέλων καὶ τὴν ἀποξήρανσιν  
τοῦ σταφιδοκάρπου. Ὁ τρυγητὸς τῶν  
σταφιδαμπέλων ὥλοκληρώθη κανονικῶς.  
Ἡ ἀποξήρανσις ὅμως τῶν σταφυλῶν ὑ-  
πῆρξεν, γενικῶς, πλημμελής. Δὲν ἐφηρμό-  
σθη κανονικὴ διαλογὴ τῶν πρὸς ἀποξή-  
ρανσιν σταφυλῶν καὶ δὲν ἔχρησιμοποι-  
ήθη χάρτης ἐπιστρώσεως εἰ μὴ εἰς περι-  
ωρισμένην κλίμακα, ὃ δὲ ἀποληφθεὶς ξη-  
ρός σταφιδόκαρπος εἰς πολλάς περιπτώ-  
σεις ἡτο ἀνεπαρκῶς ἀποξηραμένος. Πάν-  
τως ἡ παραγωγὴ ὑπῆρξεν ἀνωτέρα τῆς τοῦ  
περισσέμενου ἔτους ἡ δὲ ποιότης αὐ-  
τῆς γενικῶς καλή.

### ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Κατὰ τὸν μῆνα Ὀκτώβριον (τέλη) ἡ  
σταφιδαμπέλος εἰσῆλθεν εἰς τὸ τελευταῖον  
στάδιον τῆς ἐνεργοῦς ζωῆς τῆς διὰ τῆς  
ἐνάρξεως τῆς πτώσεως τῶν φύλλων αὐτῆς.

Ἐξ ἄλλου αἱ ἐπικρατήσασαι καιρικοὶ συνθῆκαι ἐπέτρεψαν τὴν ἔναρξιν τῆς  
ἐκτελέσεως τῆς περιλακκώσεως τῶν πρέ-  
μνων.

(Ἐκ τοῦ Γεωργικοῦ Τμήματος Α.Σ.Ο.)