

ΔΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΦΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

ΒΛΑΣΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΑΙ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΤΗΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΡΤΩΝ ΕΝΙΩΝ ΡΑΓΩΝ

Υπό Γ. Ν. ΠΑΠΑΦΙΤΣΩΡΟΥ - Σ. Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ

Γεωπόνων του Α.Σ.Ο.

Κατά την πορείαν τῆς ἐρεῦνης μας πρὸς ἐξακρίβωσιν τοῦ βαθμοῦ καὶ τῆς μορφῆς ἐκδηλώσεως τοῦ φαινομένου τῆς ἐμφανίσεως ἐγγιγάρτων ραγῶν εἰς τὴν σταφιδάμπελον, ὑπὸ τὰς διαφόρους οἰκολογικάς καὶ καλλιεργητικάς συνθήκας τῆς Πελοποννήσου, ἐπεσημάναμεν καὶ τὰς κατωτέρω περιπτώσεις παραλλασόντων τύπων σταφιδάμπελου—ὅσον ἀφορᾷ τὸ φαινόμενον τοῦτο—προελθόντων ἐκ βλαστικῆς μεταλλαγῆς αὐτῆς.

Τύπος Α'. Οὗτος συνηντήθη εἰς μεμονωμένους βραχίονας ἢ μεμονωμένας κληματίδας κανονικῶν πρέμνων σταφιδάμπελου ἢ καὶ εἰς ὁλόκληρα πρέμνα ταύτης, προελθόντα ἐκ καταβολάδων ἢ παραφυάδων. Καθ' ὅλα ὅμοιος μορφολογικῶς μετὰ τὴν σταφιδάμπελον, διαφέρει ταύτης μόνον ὡς πρὸς τὴν σταφυλὴν. Φέρει δηλαδὴ σταθερῶς κατ' ἔτος σταφυλὰς μετρίου ἢ μεγάλου μεγέθους μετὰ ἐγγιγάρτους ράγας ποκνάς, ὡσείδεις, φερούσας γόνιμα γίγαρτα εἰς ποσοστὸν ἄνω τοῦ 90 %.

Ἡ γονιμότης

δὲ τῶν γιγάρτων τούτων ἡλέγχθη διὰ προβλαστήσεως ἀριθμοῦ ἐξ αὐτῶν ἐκ τῶν ὁποίων μάλιστα ἀπεκτήσαμεν καὶ σπορόφυτα, ἡλικίας σήμερον τριῶν ἐτῶν.

Τύπος Β'. Καὶ ὁ τύπος οὗτος, καθ' ὅλα ὅμοιος μορφολογικῶς μετὰ τὴν σταφιδάμπελον, διαφέρει ταύτης ὡς πρὸς τὴν σταφυλὴν. Παράγει κατ' ἔτος, σταθερῶς, σταφυλὰς μετρίου ἢ μεγάλου μεγέθους, φερούσας ράγας μικράς, σφαιρικές, κανονικῶς ἀγγιγάρτους, μετὰ διεσπαρμένας ἀτάκτως μετὰ αὐτῶν καὶ εἰς ποσοστὸν 10—20 %, εὐμεγέθεις ὡσείδεις ράγας (ὡς τοῦ τύπου Α') μετὰ γίγαρτα πλήρη ἢ κενὰ ἐμβρύου. Ὁ τύπος οὗτος ἐπεσημάνθη κυρίως εἰς μεμονωμένα πρέμνα ἢ εἰς ομάδας 2—4 πρέμνων.

Τύπος Γ'. Ὀλιγώτερον δεδομένος τῶν ἀνωτέρω ὁ τύπος οὗτος συνηντήθη εἰς μεμονωμένα πρέμνα ἢ εἰς ομάδας 2—4 πρέμνων. Χαρακτηριστικὸν τούτου εἶναι, ὅτι φέρει κατ' ἔτος σταφυλὰς μετρίου ὥς μεγάλου μεγέθους μετὰ ὡσείδεις εὐμε-