

ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διευθυντής Δελτίου ΛΟΥΚ. Σ. ΛΟΥΚΑΣ	Περ. Γ' - Σταφ. Έτος 1962 - 63 87—88—89 Μάϊος—'Ιούνιος—'Ιούλιος 1963	Έπι της ὕλης Π. Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
---------------------------------------	--	---

ΟΔΗΓΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Ο ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΑΥΤΟΥ

‘Ο βορδιγάλειος πολτός παραμένει τὸ καλύτερον καὶ οἰκο-
νομικώτερον φάρμακον. — ‘Η ὀρθή χρησιμοποίησις αὐτοῦ

ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΤΑΦΙΔΟΣ Α. Σ. Ο.

Εἶναι γνωστόν, ὅτι ὁ περονόσπορος εἶναι ἀπὸ τῆς σοβαρώτερας ἀσθένειας τῆς σταφιδαμπέλου καὶ ἀμπέλου γενικά, προκαλὼν κατ’ ἔτος μεγάλες ζημιὰς εἰς τὴν σταφιδοπαραγωγὴν, ἐκεῖ πού δὲν καταπολεμᾶται συστηματικὰ καὶ ἐγκαίρως.

‘Αναλόγως τῶν εὐνοϊκῶν ἢ μὴ καιρικῶν συνθηκῶν, πού ἐπικρατοῦν κατὰ τὸ φθινόπωρον καὶ τὸν χειμῶνα ἀλλὰ κυρίως κατὰ τὴν ἀνοιξιν ἕως ἀρχῆς τοῦ θέρους (Μάϊος—'Ιούνιον) ὁ περονόσπορος ἐμφανίζεται ἄλλοτε ὑπὸ ἡπίας καὶ ἄλλοτε ὑπὸ βαρείαν ἢ καὶ ἐπιδημικὴν μορφήν.

‘Αλλὰ ὑπὸ οἵανδήποτε μορφήν καὶ ἂν ἐμφανίζεται οὗτος, πάντοτε καταπολεμᾶται, ἀρκεῖ οἱ ἀμπελουργοὶ νὰ ἐφαρμόζουν καλῶς τὰ μέτρα τῆς προληπτικῆς καταπολέμησης τούτου, διότι, ὡς γνωστόν, ὁ περονόσπορος προλαμβάνεται καὶ δὲν θεραπεύεται. Εἶναι δὲ τὰ μέτρα αὐτὰ ἢ διὰ ψεκασμῶν συνεχῆς κάλυψις τῆς εὐπαθοῦς βλάστησεως, τῶν ἀνθέων καὶ τῶν σταφυλῶν τῆς σταφιδαμπέλου μὲ μυκητοκτόνα φάρμακα, ἀπὸ τοῦ τελευταίου δεκαήμερου τοῦ ‘Απριλίου μέχρι τοῦ τελευταίου δεκαήμερου τοῦ 'Ιου-

νίου, μὲ τὸν σκοπὸ νὰ προληφθῇ ἡ εἰσόδος καὶ ἐγκατάστασις τοῦ παρασίτου ἐντὸς τῶν ἰσθμῶν τοῦ φυτοῦ.

‘Η ἀποτελεσματικότης ὁμῶς τῶν μέτρων τούτων ἐξαρτᾶται ἀπὸ τοὺς ἐξῆς παράγοντας : α) ‘Απὸ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν ψεκασμῶν εἰς τὴν κατάλληλον στιγμὴν. β) ‘Απὸ τὴν ἀποτελεσματικότητα τοῦ χρησιμοποιουμένου φαρμάκου καὶ γ) ‘Απὸ τὴν προσοχὴ καὶ ἐπιμέλεια, πού καταβάλλει ὁ κάθε παραγωγὸς εἰς τὴν παρασκευὴν τοῦ φαρμάκου καὶ εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ψεκασμῶν.

Διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ψεκασμῶν εἰς τὴν κατάλληλον στιγμὴν, πρέπει ὁ κάθε παραγωγὸς νὰ ἔχῃ ὑπ’ ὄψει του τὰ ἐξῆς : 1) ‘Επειδὴ γενικά ὁ εὐνοϊκώτερος ὅρος πολλαπλασιασμοῦ καὶ διαδόσεως τοῦ περονόσπορου εἶναι ἡ βροχή, πρέπει, ὅταν σημειωθῇ τοιαύτη καὶ κυρίως μετὰ τὴν διαπίστωσιν τῆς πρώτης μολύνσεως (πρῶτες βούλες περονόσπορου στὰ φύλλα) ὅλη ἡ βλάστησις νὰ εἶναι κεκαλυμμένη μὲ ἐπαρκὴ ποσότητα φαρμάκου. ‘Επίσης, ἂν συνεπεία αὐτῆς ἀπεπλῦθη τὸ φάρμακο, πρέπει νὰ ψεκάσῃ ἀμέσως μετὰ ἀπὸ αὐ-