

όποιας θά διδάσκωνται αἱ σύγχρονοι μέθοδοι ἀλέσεως καὶ ἀρτοποιίας. Εἰς τὴν λειτουργίαν τῶν σχολῶν αὐτῶν θά βοηθήσῃ τὸ Ὑπουργεῖον Ἑργασίας. Αἱ σχολαὶ θά λειτουργήσουσι, ἡ μία εἰς τὴν Σχολὴν «Μέτων», ἡ ἄλλη εἰς τὴν Σχολὴν «Εὐκλείδης» τῆς Θεσσαλονίκης.

Ὁ κ. ὕφυπουργὸς ἐξέφρασε τὴν γνώμην, ὅτι ἐλπίζει ἡ νέα Κυβέρνησις θά υἱοθετήσῃ τὰ ἀνωτέρω, ἵνα τοιοῦτοτρόπως ὁ ἐλληνικὸς λαὸς δυνηθῇ νὰ ἔχῃ ἄρτον εἰς ἀπειρώς καλυτέραν ποιότητα, ἀλλὰ καὶ συγχρόνως μὲ πλουσιώτερα θρεπτικὰ συστατικά.

Ἀλλὰ πέραν αὐτῶν, ὡς ἐδήλωσεν ὁ κ. ὕφυπουργός, θά ἐπιτευχθῇ διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ ἡ ἐσωτερικὴ κατανάλωσις στα-

φίδος κατὰ 20.000 τόννους ἐτησίως. Ἐπίσης θά χρησιμοποιηθῇ ἡ παραγομένη ἀπὸ τὰ ἐλληνικὰ λαχαροποιεῖα μέλασσα, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν πρώτην ὕλην διὰ τὴν παρασκευὴν τῆς ζύμης ἀρτοποιίας (μαγιᾶς).

Ὁ παριστάμενος κατὰ τὰς ἀνωτέρω ἀνακοινώσεις τοῦ κ. ὕφυπουργοῦ κ. Κονδύλης διηκρίνησεν, ὅτι διὰ τοῦ ἀνωτέρω τρόπου ἐνισχύεται ὁ ἐλληνικὸς σίτος καὶ ὅτι ὁ παραγόμενος ἄρτος ἔχει ἀρίστην γεῦσιν καὶ τρώγεται εὐχαρίστως μὲ ὅλα τὰ φαγητά. Κατὰ τὰ διενεργηθέντα πειράματα ἐχρησιμοποιήθη ἀποτελεσματικὸς ποσοστὸν 2,5 % σταφιδίνης καὶ 1 % ζύμης ἀρτοποιίας. Ἀναμένεται ὅτι τὸ κόστος τοῦ ἄρτου θά αὐξηθῇ κατὰ 20 ἔως 30 λεπτά.

Γενικὴ ἀνασκόπησις τῆς σταφιδοκαλλιέργειας

Μετεωρολογικὰ Δελτία



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Αἱ συνεχισθεῖσαι κατὰ τὸν μῆνα τοῦτον ξηροθερμικαὶ συνθήκαι ἐπέδρασαν, γενικῶς, εὐνοϊκῶς εἰς τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς ὀριμάνσεως τῶν σταφυλῶν τῆς σταφιδαμπέλου καὶ εἰς τὴν κανονικὴν ἀποξήρανσιν τούτων. Ἐσημειώθησαν καὶ μεμονωμένα μικροζημίαι ἐξ ἡλιάσεως, λόγω πτώσεως τῶν φύλλων ἐξ ἐγκαυμάτων. Ἡ σημειωθείσα, κατὰ τὴν 31ην τοῦ μηνὸς γενικὴ βροχόπτωσης εἰς ὁλόκληρον τὸν Νομὸν δὲν ἐπροξένησεν γενικῶς ζημίας οὔτε ἐπὶ τοῦ ἀνηρημένου σταφιδοκάρπου οὔτε τοῦ τοιοῦτου ἐπὶ τῶν σταφιδαλῶνων ἐκτὸς μεμονωμένων περιπτώσεων.

Ὁ τρυγητὸς καθυπέρτησε ἔναντι τοῦ περυσίου κατὰ 5-6 ἡμέρας, ἡ δὲ παραγωγή προβλέπεται κατὰ πολὺ μειωμένη ἔναντι τῆς περυσινῆς (35-40 %) λόγῳ κυρίως τοῦ περionoσπόρου ἀλλὰ καὶ ἄλλων αἰτίων.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Κατὰ τὸν μῆνα Σεπτέμβριον ὁλοκληρώθη ὁ τρυγητὸς τῶν σταφιδαμπέλων καὶ

ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποξήρανσις τοῦ σταφιδοκάρπου ὑπὸ εὐνοϊκᾶς καιρικᾶς συνθήκας.

Ἡ σταφιδάμπελος εἰσηλθεν εἰς τὸ στάδιον ἀποταμιεύσεως θρεπτικῶν οὐσιῶν καὶ εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ τέλους τῆς ἐνεργου αὐτῆς ζωῆς διὰ τῆς πτώσεως τῶν πρώτων φύλλων τῆς βάσεως τῶν κληματίδων.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Αἱ ἐπικρατήσαναι λιαν βροχераὶ συνθήκαι κατὰ τὸν μῆνα Ὀκτώβριον ἐπέτρεψαν τὸν σχηματισμὸν ἀφθόνων ὡσπορίων τοῦ περionoσπόρου ἐπὶ τῶν φύλλων τῆς σταφιδαμπέλου. Αἱ σταφιδάμπελοι συνεχίζουσαι τὴν ἀποταμιεύσιν θρεπτικῶν οὐσιῶν ὁδεύουν πρὸς τὸ τέλος τῆς ἐνεργου αὐτῶν ζωῆς χαρακτηριζομένου ἀπὸ τὴν φυλλόπτωσησιν τῶν πρέμων, ἥτις ἐσυνεχίσθη εἰς ἐντονώτερον βαθμὸν ἔναντι τοῦ προηγουμένου μηνός. Κατὰ τὸν ἐν λόγω μῆνα ἤρχισαν αἱ ἐργασίαι τῆς νέας καλλιεργητικῆς περιόδου ἥτοι ἡ συλλογὴ τῶν τσιτῶν καὶ ἡ διενέργεια τῆς περιλακκώσεως τῶν πρέμων.

Ἐκ τοῦ Γεωργικοῦ Τμήματος Α.Σ.Ο.