

πρέμνων ἐκάστης ὑποπεριπτώσεως. Κατ' αὐτὰς ἐμετράτο γενικῶς ὁ ἀριθμὸς τῶν φύλλων καὶ τῶν σταφυλῶν τῶν φερόντων

προσβολὰς περονοσπόρου. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς μετρήσεως δίδονται εἰς τὸν κατωτέρῳ πίνακα.

### Π Ι Ν Α Ξ 1

Ἐμφαίνων τὸν ἀριθμὸν τῶν προσβεβλημένων φύλλων τῶν παρατηρηθέντων ἐπὶ δύο πρέμνων τυχαίως ληφθέντων ἐξ ἐκάστου ἀντικειμένου ἐκάστης ὑποπεριπτώσεως τὴν 5—6—63

'Αντικείμενα	'Υποπεριπτώσεις			
	1 (4ή- μερον)	2 (8ή- μερον)	3 (11ή- μερον)	4 (14ή- μερον)
Βορδιγάλειος πολτός 2 %	1	3	8	11
Χαλκοζάν	0	0	4	10
ZINEB	4	6	11	30
Κάπταν	6	30	33	56
'Οξυχλωριοῦχος χαλκός «VITIGRAN»	2	15	35	45
Μανέμπ	7	31	56	60
Βορδιγάλειος πολτός 1 %	16	32	54	57
Κολλοειδής χαλκός «IALINE»	14	30	55	56
Μάρτυς				

Ἐκ τοῦ ἀνωτέρω πίνακος προκύπτουν τὰ ἀκόλουθα :

1. Εἰς τὴν πρώτην ὑποπεριπτώσιν ἔπαντα τὰ φυτοφάρμακα ἀπεδίχθησαν ἵκανα ὅπως παρέξουν προστασίαν εἰς τὸ φύλλωμα τῶν πρέμνων ἔναντι τῶν προσβολῶν τοῦ περονοσπόρου καὶ δὴ κατὰ τὴν ἀκόλουθον σειράν : Χαλκοζάν, Βορδιγάλειος πολτός 2 %, ὀξυχλωριοῦχος χαλκός (VITIGRAN), Zineb, Κάπταν, Μανέμπ, Κολλοειδής χαλκός «IALINE» Βορδιγάλειος πολτός 1 %.

2. Εἰς τὴν δευτέραν ὑποπεριπτώσιν ἐκ τῶν χρησιμοποιηθέντων φυτοφαρμάκων, ἵκανα διὰ τὴν παροχὴν προστασίας εἰς τὸ

### Π Ι Ν Α Ξ 2

Ἐμφαίνων τὸν ἀριθμὸν τῶν προσβεβλημένων σταφυλῶν τῶν μετρηθεισῶν ἐπὶ δύο πρέμνων, τυχαίως ληφθέντων ἐξ ἐκάστου ἀντικειμένου ἐκάστης ὑποπεριπτώσεως τὴν 5—6—63

'Αντικείμενα	'Υποπεριπτώσεις			
	1 (4ή- μερον)	2 (8ή- μερον)	3 (11ή- μερον)	4 (14ή- μερον)
Βορδιγάλειος πολτός 2 %	0	0	0	0
Χαλκοζάν	0	0	0	0
Zinéb	0	0	0	0
CAPTAN	0	1	1	4
'Οξυχλωριοῦχος χαλκός VITIGRAN	0	0	1	2
MANEB	0	0	2	8
Κολλοειδής χαλκός «IALINE»	0	1	2	4
Βορδιγάλειος πολτός	0	1	4	8
Μάρτυς				

"Απασαι "Απασαι "Απασαι "Απασαι