

Π Ι Ν Α Ξ 4

Διενέργεια ψεκασμῶν ἀνὰ 8ήμερον (2α Ὑποπερίπτωσης)

Ἀντικείμενα φυτοφαρμάκων	Ποσοστὸν προσβολῆς σταφυλῶν % Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Ε Ι Σ					Μ. ὁρος
	1	2	3	4	Σύνολον	
Βορδιγάλειος πολτὸς 2 %	0	0	0	6	6	1,5
Χαλκοζάν	0	0	0	0	0	0
ZINEB	0	0	3	0	3	0,75
CAPTAN	0	3	0	3	6	1,5
Ὄξυχλωριούχος χαλκὸς «VITIGRAN»	0	0	2	3	5	1,25
MANEB	0	16	0	6	22	5,5
Βορδιγάλειος πολτὸς 1 % Κολλοειδῆς χαλκὸς «ΙΑ- LINE»	0	9	42	21	72	18
Μάρτυς	6	5	0	5	16	4
	100	100	100	100	400	100
Σ.Σ.Δ. (διὰ P=5 %)=14,4						

Ἐκ τῆς στατιστικῆς ἀναλύσεως τοῦ ἀνωτέρω πίνακος προκύπτει ὅτι ἅπαντα τὰ φυτοφάρμακα εἶναι μεταξύ των ἰσοδύναμα πλὴν τοῦ Βορδιγαλείου πολτοῦ 1 % ὅστις ὑπέστησεν. Ἡ παρατηρουμένη διαφορὰ μεταξύ αὐτοῦ καὶ τῶν λοιπῶν φαρμάκων εἶναι στατιστικῶς σημαντική.

Π Ι Ν Α Ξ 5

Διενέργεια ψεκασμῶν ἀνὰ 11ήμερον (3η Ὑποπερίπτωσης)

Ἀντικείμενα φυτοφαρμάκων	Ποσοστὸν προσβολῆς σταφυλῶν % Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Ε Ι Σ					Μ. ὁρος
	1	2	3	4	Σύνολον	
Βορδιγάλειος πολτὸς 2 %	0	0	0	10	10	2,5
Χαλκοζάν	0	0	0	0	0	0
ZINEB	0	3	0	0	3	0,7
CAPTAN	2,5	0	0	7	9,5	2,3
Ὄξυχλωριούχος χαλκὸς «VITIGRAN»	2,5	0	0	0	2,5	0,6
MANEB	8	20	16	7	51	12,7
Βορδιγάλειος πολτὸς 1 % Κολλοειδῆς χαλκὸς «ΙΑ- LINE»	50	32	66	72	220	55
Μάρτυς	16	20	12	10	58	14,5
	100	100	100	100	400	100
Σ.Σ.Δ. (διὰ P=5 %)=40,5						

Ἐκ τῆς στατιστικῆς ἀναλύσεως τοῦ ἀνωτέρω πίνακος προκύπτει ὅτι ἅπαντα τὰ φάρμακα εἶναι μεταξύ των ἰσοδύναμα πλὴν

τοῦ Βορδιγαλείου πολτοῦ 1 % ὅστις ὑπέστησεν. Αἱ παρατηρούμεναι μεταξύ των διαφοραὶ δὲν εἶναι στατιστικῶς σημαντικά.