

Γενική ανασκόπησις τῆς σταφιδοκαλλιέργειας

Μετεωρολογικά Δελτία



ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Χαρακτηριστικόν τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου ἀποτελεῖ ἡ σημειωθείσα κατ' αὐτὸν μικρὰ βροχόπτωσις, ἡ ὁποία δὲν ἠνόνησε καὶ τὴν ἐμφάνισιν τοῦ περionoσπόρου. Παραλλήλως αἱ συνθῆκαι θερμοκρασίας ἠνόνησαν τὴν κανονικὴν ἔκπτυξιν καὶ ἀνάπτυξιν τῆς βλαστήσεως τῶν σταφιδαμπέλων, αἱ ὁποῖαι, σημειωτέον, φέρουν μειωμένον ἀριθμὸν σταφυλῶν, ἰδίᾳ αἱ προσβληθεῖσαι κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος ἰσχυρῶς ὑπὸ περionoσπόρου. Αἱ καλλιεργητικαὶ ἐργασίαι, λόγῳ τοῦ εὐνοϊκοῦ καιροῦ, ἐξετελέσθησαν ἐγκαιρῶς καὶ κανονικῶς, πλὴν ὅμως παρατηρήθη ἑλλειψίς ἐργατικῶν χειρῶν καὶ ὑπερτίμησις τῶν ἡμερομισθίων. Ἐγένοντο προληπτικοὶ ψεψασμοὶ κατὰ τοῦ περionoσπόρου.

ΜΑΪΟΣ

Ἡ βλάστησις, ἡ ἀνθισις καὶ καρπόδεσις τῶν σταφιδαμπέλων, λόγῳ τῶν εὐνοϊκῶν καιρικῶν συνθηκῶν, ἐξειλίχθησαν ὁμαλῶς. Ἄν καὶ ὁ μὴν οὗτος δύναιται νὰ χαρακτηρισθῇ ὡς βροχερὸς ἐν τούτοις δὲν ἔχομεν ἐμφάνισιν περionoσπόρου. Οὗτος ἐνεφανίσθη εἰς περιορισμένη κλίμακα καὶ ἄνευ σημασίας, εἰς ὠρισμένας περιφερείας ὅπου ἐσημειώθησαν ὕψηλαι βροχοπτώσεις. Αἱ ἐστὶν αὗται ἀπέβησαν πηγαὶ διὰ τὴν μεταφορὰν τῶν κονιδίων καὶ εἰς ἑτέρας περιοχὰς καὶ τὴν ἐμφάνισιν δευτερογενῶν μολύνσεων, ἄνευ ὅμως πρακτικῆς σημασίας. Γενικῶς ἡ ὑγεία τῶν σταφιδαμπέλων εἶναι ἀρίστη. Διενηργήθησαν προληπτικαὶ καταπολεμήσεις τῶν ἀσθενειῶν καὶ ἐχθρῶν τῆς ἐποχῆς (περionoσπόρου, ὠίδιου, εὐδεμίδος). Αἱ καλλι-

εργητικαὶ ἐργασίαι διεξήχθησαν ὁμαλῶς ἀλλὰ μὲ ὑπερτιμημένα ἡμερομισθία.

ΙΟΥΝΙΟΣ

Ὁλοκληρωθείσης τῆς χαραγῆς τῶν σταφιδαμπέλων κατὰ τὸ πρῶτον πενήμημερον τοῦ ἐν λόγῳ μηνὸς καὶ περατωθέντος μέχρι τοῦ τέλους τοῦ πρῶτου 10ήμερου αὐτοῦ τοῦ ψεκασμοῦ τῶν σταφυλῶν σταφιδαμπέλων τινῶν διὰ τῆς ἀδξητικῆς ὁρμόνης 3 C.P.A. (4 χλωροφαινοξυζικὸν ὀξύ) συνετελέσθη κανονικῶς ἡ καρπόδεσις τῶν σταφυλῶν καὶ ἐξειλίχθη ὁμαλῶς ἡ ἀδξησις τῶν μεγέθους τῶν ραγῶν αὐτῶν.

Περὶ τὰ μέσα ἕως τὸ τέλος τοῦ δευτέρου 10ήμερου παρατηρήθη ἀνάσχεσις τῆς βλαστήσεως, ἐνῶ κατὰ τὸ τέλος τοῦ τρίτου 10ήμερου ἔχομεν τὴν ἐμφάνισιν τοῦ περκασμοῦ τῶν σταφυλῶν εἰς τὰς πρῶτους τοποθεσίας.

Αἱ ἐπικρατήσασαι ἐξ ἄλλου δροσεραὶ καιρικαὶ συνθῆκαι κατὰ τὸν μῆνα τοῦτον (βροχαὶ εἰς τινὰς περιφερείας, ὕψηλὴ σχετικὴ ὑγρασία, μετρία θερμοκρασία) ἠνόνησαν τὴν ἐμφάνισιν τοῦ ὠίδιου γενικῶς καὶ τοῦ περionoσπόρου περιορισμένως, οὐχὶ βεβαίως εἰς βαθμὸν ἀνησυχητικόν.

Μετὰ τὴν καρπόδεσιν τῶν σταφυλῶν, προβλέπεται, ὅτι ἡ παραγωγή θὰ ὑποληφθῇ τῆς τοιαύτης τοῦ ἔτους 1962 τοῦλάχιστον κατὰ 20 %.

ΙΟΥΛΙΟΣ

Αἱ ἐπικρατήσασαι καιρικαὶ συνθῆκαι κατὰ τὸν μῆνα Ἰουλίον κρίνονται ὡς εὐ-