

δοποία ἐντὸς τῶν ψυγείων εἶναι εὐνοϊκὴ διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς φαιᾶς σήψεως ἐπὶ τῶν σταφυλῶν, ἐπίσης καὶ ἡ θερμοκρασία εἶναι ἔνας περιοριστικὸς παράγων ἀναπτύξεως της. Οὕτω ἔχει ἀποδειχθῆ ὅτι εἰς θερμοκρασίαν 3°C. ἡ μόλυνσις καὶ ἡ προσβολὴ τῶν ραγῶν ἐκ τῆς φαιᾶς σήψεως ἐξεδηλώθησαν μετὰ 72—84 ὥρας,

ἐνῷ εἰς θερμοκρασίαν 16° C. ἡ ἀσθένεια ἐξεδηλώθη μετά 12—24 ὥρας. Φαίνεται δὲ ὅτι ἡ προσβολὴ εὐνοεῖται ἐπίσης καὶ ἐκ τοῦ περιεχομένου ἐντὸς τῶν χυμῶν τῶν σταφυλῶν, ποσοῦ σακχάρων, δεδομένης τῆς μεγαλυτέρας ἢ μικροτέρας ἐπιδεκτικότητος τῶν διαφόρων ποικιλιῶν ἔναντι τῆς ἀσθενείας.

### Προφύλαξις τῶν σταφυλῶν ἐκ τῶν ἀλλοιώσεων κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς συντηρήσεώς των ὑπὸ ψῆξιν

Διὰ τὴν προφύλαξιν τῶν σταφυλῶν, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς συντηρήσεώς των ἐντὸς τῶν ψυκτικῶν θαλάμων, πρέπει νὰ ληφθοῦν δόλα τὰ κατάλληλα μέτρα πρὸς ἔξουδετέρωσιν τῶν αἰτίων τὰ δόπια προκαλοῦν τάς διαφόρους ἀλλοιώσεις καὶ ζημίας αὐτῶν.

Εἰδικῶς διὰ τάς παρασιτικάς ἀλλοιώσεις καὶ ἀσθένειας καὶ εἰδοτέρων δύον ἀφορῷ τὴν φαιὰν σῆψιν, ήτις εἶναι ἡ κυριωτέρα καὶ σοβρωτέρα ἀσθένεια τῶν συντηρούμενων σταφυλῶν, πρέπει νὰ ληφθοῦν τὰ κάτωθι μέτρα.

α) Προστασία τῶν σταφυλῶν εἰς τοὺς ἀμπελῶνας καὶ κατάλληλος μεταχείρισις αὐτῶν κατὰ τὴν συγκομιδὴν, διαλογήν καὶ συσκευασίαν.

β) Προστασία τῶν σταφυλῶν διὰ προληπτικῶν ἐπεμβάσεων κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς συντηρήσεώς των ὑπὸ ψῆξιν.

Διὰ τὴν ἀρίστην προφύλαξιν καὶ συντήρησιν τῶν νωπῶν σταφυλῶν ἐκ τῆς φαιᾶς σήψεως, πρέπει νὰ ληφθοῦν ἀμφότερα τὰ ἀνωτέρω προληπτικά μέτρα, διότι ἡ παράλειψις τοῦ ἐνὸς δὲν ἔξασταλεῖται τὴν τελείαν προστασίαν των.

Πράγματι αἱ διενεργούμεναι ἐπεμβάσεις ἐντὸς τῶν ψυκτικῶν θαλάμων, πρὸς καταπολέμησιν τῶν σπορίων τοῦ μύκητος τῆς φαιᾶς σήψεως καὶ οὕτα ἀποφυγὴν μολύνσεων καὶ ἀναπτύξεως τῆς ἀσθένειας, εἶναι ἀνίκαναι νὰ περιορίσουν τὴν ἔξελιξιν τῶν μολυνθεισῶν καὶ προσβεβλημένων σταφυλῶν πρὸ τῆς συντηρήσεώς των, διότι αἱ σταφυλαὶ αὗται συχνά-

κις δὲν ἐμφανίζουν τὰ ἔξωτερικὰ ἐμφανῆ συμπτώματα τῆς ἀσθενείας κατὰ τὴν διαλογήν καὶ συσκευασίαν των.

Απὸ τὴν ἄλλην πλευράν ἐπίσης, αἱ μυκητοκτόνοι ἐπεμβάσεις εἰς τοὺς ἀμπελῶνας ὡς καὶ τὰ κατάλοιπα τῶν φυτοφαρμάκων ἐπὶ τῶν σταφυλῶν εἶναι ἀνίκανα νὰ ἐμποδίσουν νέας μολύνσεις καὶ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ἀσθενείας ἐπὶ τῶν σταφυλῶν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς μετέπειτα συντηρήσεώς των ἐντὸς τῶν ψυκτικῶν θαλάμων.

Ἡ προστασία τῶν σταφυλῶν εἰς τοὺς ἀμπελῶνας ἀπαιτεῖ ἀφ' ἐνὸς μὲν τὴν ληψιν ὅλων τῶν ἀπαραίτητων προληπτικῶν ἐπεμβάσεων διὰ μυκητοκτόνων φαρμάκων πρὸς καταπολέμησιν τῆς ἀναπτύξεως καὶ μεταδόσεως τῆς φαιᾶς σήψεως καὶ τῶν ἄλλων ἀσθενειῶν ἀφ' ἕτερου δὲ τὴν ἐπιμελῆ ἐκτέλεσιν καταλλήλων καλλιεργητικῶν φροντίδων (ἀραιόμα, ξεφύλλισμα κ.λ.π.) τὰ δόπια θὰ ἐπιτρέψουν τὸν σχηματισμὸν ὑγιῶν σταφυλῶν καὶ τὸν καλλιτερὸν ἀερισμὸν αὐτῶν, παράγοντος δοτικῆς ἐμποδίζει τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ἀσθενείας, ἡ ὁποία εὐνοεῖται ἐκ τῆς ὑγρασίας.

Ἐν συνεχείᾳ, ως ἐλέχθη ἡδη, μεγάλη προσοχὴ πρέπει νὰ δίδεται εἰς τὰς μετέπειτα ἐργασίας τῆς συλλογῆς, μεταφορᾶς, διαλογῆς καὶ συσκευασίας τῶν προορίζομένων διὰ συντηρήσιν σταφυλῶν, ἵνα αὔται φθάσουν εἰς τοὺς ψυκτικοὺς θαλάμους τελείως ὑγιεῖς καὶ ἀνευ τραυμάτων, μωλώπων ἢ βεβλαμμένων ραγῶν, αἱ ὁποῖαι

**ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ  
προσέξατε!!!**

**‘Ακολουθήσατε καὶ ἐφαρμόσατε πιστὰ τὶς ὁδηγίες τοῦ Αὐτονόμου Σταφιδικοῦ ‘Οργανισμοῦ γιὰ τὴν παρασκευὴν καλῆς ποιότητος σταφίδος.**