

Γενική ἀνασκόπησις ἰῆῆῆ τῆς σταφιδοκαλλιεργείας Μετεωρολογικά Δελτία



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Αἱ κατὰ τὸν ὑπ' ὄνιν μῆνα ἐπικρατή-
σασαι καιρικάι συνθηκαὶ ἠνύνησαν τὴν
ὁμαλὴν ἐξέλιξιν τοῦ βιολογικοῦ κύκλου
τῆς σταφιδαμπέλου ἀφ' ἐνὸς καὶ τὴν ἐκτέ-
λεσιν τῶν ἐποχιακῶν ἐργασιῶν αὐτῆς ἀφ'
ἐτέρου.

Ἡ ἐνεργὸς δραστηριότης τῆς σταφιδά-
μπέλου περιορίσθη εἰς τὸ ἐλάχιστον. Ἡ
φυλλόπτωση ἐσυνεχίσθη ἐπιταχυνθεῖσα
μάλιστα μετὰ τὸ Βον 15νθήμερον τοῦ μη-
νὸς λόγω τῶν σημειωθεισῶν κατ' αὐτὸ
χαμηλῶν θερμοκρασιῶν.

Ἡ ἀρξασμένη ἀπὸ τὸν προηγούμενον
μῆνα περιλάκκωσις ἐσυνεχίσθη καὶ ἤρ-
χισεν ἡ ἐφαρμογὴ τῆς φωσφοροκαλιούχου
λιπάνσεως καὶ ἡ σπορὰ φυτῶν διὰ χλω-
ρᾶς λιπάνσεως. Ἐπίσης ἤρχισεν ὑπότι-
νον παραγωγῶν καὶ ὁ κλαδοκάθαρος τῆς
σταφιδαμπέλου.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Κατὰ τὸν ἐν λόγῳ μῆνα ἡ σταφιδά-
μπελος εἰσῆλθεν ὀριστικῶς πλεον εἰς τὸ
στάδιον τοῦ ληθάργου αὐτῆς, στάδιον Α.
Πᾶσα ἐμφανὴς ζωικὴ δραστηριότης ἐστα-
μάτησε.

Ἀπὸ πλευρᾶς καιρικῶν συνθηκῶν ὁ
μῆν οὗτος ἦτο ὀλιγώτερον βροχερὸς τοῦ
ἀντιστοίχου του, τοῦ περασμένου ἔτους·
ἀλλὰ ξηρότερος καὶ ψυχρότερος τούτου.

Κατ' αὐτὸν ἐσυνεχίσθη ὁ κλαδοκάθα-
ρος καὶ ἡ φωσφοροκαλιούχος λιπανσις
τῶν σταφιδοφυτειῶν. Τὰ ἡμερομίσθια ἐκί-
μάνθησαν εἰς ὑψηλότερα ἐπίπεδα τῶν
περισυνῶν.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Αἱ ἐπικρατήσασαι κατὰ τὸν μῆνα τοῦ-
τον καιρικάι συνθηκαὶ (βροχαὶ καὶ ψυχός)

κρίνονται εὐνοϊκαὶ διὰ τὴν φυσιολογίαν
τοῦ φυτοῦ (πλήρης χειμερία νάρκη). Κατ'
αὐτὸν ἤρχισεν τὸ κλάδευμα τῶν φυτῶν,
ἐσυνεχίσθη ἡ λίπανσις αὐτῶν μὲ φωσφο-
ροκαλιούχα καὶ ἀζωτοῦχα λιπάσματα καὶ
ἐγένετο ἐναρξίς καταπολέμησεως τῆς
ἴσκας. Τὰ ἡμερομίσθια ἐκυμάνθησαν εἰς
ὑψηλότερα ἐπίπεδα ἔναντι τῶν περυσινῶν.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Αἱ ἐπικρατήσασαι κατὰ τὸν ἐν λόγῳ
μῆνα χαμηλαὶ θερμοκρασῖαι κρίνονται
εὐνοϊκαὶ διὰ τὴν φυσιολογίαν τῆς σταφι-
δαμπέλου (παράτισις τῆς χειμερίας νάρ-
κης).

Κατ' αὐτὸν συνεχίσθη τὸ κλάδευμα,
ἡ λίπανσις καὶ ἡ καταπολέμησις τῆς
ἴσκας τῆς σταφιδαμπέλου. Τὰ ἡμερομίσ-
θια ἐκυμάνθησαν εἰς ὑψηλότερα ἐπίπεδα
ἔναντι τῶν περυσινῶν.

ΜΑΡΤΙΟΣ

Κατὰ τὸν μῆνα τοῦτον ἡ σταφιδάμπε-
λος ἐξέρχεται τῆς χειμερίας αὐτῆς νάρ-
κης καὶ εἰσέρχεται εἰς τὴν ἐνεργὸν ζωὴν,
πρῶτη ἐκδήλωσις τῆς ὁποίας εἶναι ἡ δα-
κρυόρροια. Εἰς τινὰς θερμοῦς τοποθεσίας
παρατηρεῖται καὶ ἔκπτυξις τῶν ὀφθαλμῶν
αὐτῆς.

Ἀπὸ ἀπόψεως καλλιεργητικῶν ἐργα-
σιῶν κατὰ τὸν ἐν λόγῳ μῆνα ἔχομεν
ὀλοκλήρωσιν τῆς λιπάνσεως διὰ προσθή-
κης Ντούχων λιπασμάτων, πασάλωμα τῶν
πρέμνων καὶ γενίκευσιν τῆς σκαφῆς τῶν
σταφιδοφυτειῶν. Παρατηρεῖται εἰς αὐξου-
σαν κλίμακα ἡ χρησιμοποίησις τῶν μο-
νοαζονικῶν καλλιεργητικῶν μηχανῶν
(φρέζαι) ἐνῶ ἐκ παραλλήλου ἡ ἔλλειψις
ἐργατικῶν χειρῶν ἔχει ὡς συνέπειαν τὴν
ὑπερτίμησιν τῶν ἡμερομισθίων.

(Ἐκ τοῦ Γεωργικοῦ Τμήματος)