

πρωίμους ποικιλίας καὶ δὴ ἐπιτραπεζίους.

2. 333 E. M. TISSERAND : Cabernet Sauvignon X Berlandieri. Ἀντέχει εἰς τὴν φυλλοξήραν. Ἀντοχή εἰς τὸ ἀνθρακικὸν ἀσβέστιον μεγαλύτερα τῆς τοῦ 41B. Προσοικεῖται εἰς ξηρὰ ἢ ὑγρὰ ἐδάφη. Ἡ ζήτησις του αὐξάνεται τελευταίως.

VI. ΥΒΡΙΔΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ

1. 106—8 MGT : (Riparia X Cordifolia—Rupestris No 1 Gr.) Μεγάλη φυλλοξήρικη ἀντοχή. Προσοικεῖται εἰς ἐδάφη ἀργιλλοπυριτικά μὴ ἀσβεστοῦχα. Εἰς τὴν Ἑλλάδα δὲν ἐχρησιμοποίηθη εἰς γεωργικὴν κλίμακα.

2. 44—53 MALEGUE : (Riparia Grand Clabre X 144 N). Ἀντοχή εἰς τὴν φυλλοξήραν μεγάλη. Ἀνθεκτικὸν εἰς τὸν μολυσματικὸν ἐκφυλλισμόν καὶ τὴν ξηρασίαν. Ἀντοχή εἰς τὸ ἐνεργὸν ἀσβέστιον μέχρι 10 ο/ο. Ριζοβόλησις ἱκανοποιητική. Ἐπιτυχία εἰς τὸν ἐμβολιασμόν πολὺ καλή.

3. 16—16 Couderc : Ἐπετεύχθη εἰς τὴν Γαλλίαν ὑπὸ τοῦ Couderc διὰ διασταυρώσεως τοῦ Solonis X Riparia Gloire di Montpellier. (Solonis=Riparia—Rupestris—Candicans). Ὑποκείμενον ἀναρριχητικόν. Εὐρωστία καὶ ὀρίμανσις τοῦ ξύλου καλή. Ἀντέχει εἰς τὴν φυλλοξήραν καὶ τὰς κρυπογαμικὰς ἀσθενείας. Ἀντέχει εἰς τὰ ὑγρὰ ἐδάφη καὶ εἰς τὰ ἄλατα. Ἡ ἀντοχή του εἰς τὸ ἀνθρακικὸν ἀσβέστιον εἶναι ἀνάλογος τῶν Riparia X Rupestris. Προσοικεῖται εἰς ἐδάφη φρέσκα καὶ βαθέα.

4. 106.8 Millardet e de Grasset : Ἐπετεύχθη εἰς τὴν Γαλλίαν τὸ 1882 ἀπὸ τὸν Millardet e de Grasset διὰ διασταυρώσεως Riparia X (Cordifolia—Rupestris). Ὑποκείμενον ἀναρριχητικόν. Εὐρωστία καὶ ὀρίμανσις τοῦ ξύλου καλή. Ἀντέχει εἰς τὴν φυλλοξήραν καὶ τὰς κρυπογαμικὰς ἀσθενείας. Ριζοβολεῖ εὐκόλως. Προσοικεῖται εἰς ἐδάφη ἀργιλλώδη, συνεκτικὰ ἔστω καὶ ὑγρὰ.

5. 1613 Couderc : Ἐπετεύχθη τὸ 1881 διὰ διασταυρώσεως τοῦ Solonis X Othelo. Solonis=Riparia—Rupestris—Candicans. Othelo=Labrussa—Riparia—Vinifera. Χρησιμοποιεῖται δι' ἀρδευομένας ἀμώδεις ἐκτάσεις ἐνθα ἐνήμουν οἱ νηματώ-

δεις. Εἶναι φορεὺς τοῦ μολυσματικοῦ ἐκφυλλισμού. Εἰς τὴν Εὐρώπην δὲν ἐχρησιμοποιήθη ἀκόμη.

6. Richter 31 : Ἐπετεύχθη ὑπὸ τοῦ Richter τὸ 1889 διὰ διασταυρώσεως τοῦ Berlandieri Resseguier No 2 X Νοῦο Mexicana. Ἀντοχή εἰς ἀνθρακικὸν ἀσβέστιον 50—60 ο/ο, ὀλικόν, ἐνεργὸν 17 ο/ο. Παρουσιάζει μεγαλύτεραν ἀντοχὴν εἰς τὰ ἄλατα. Ριζοβολεῖ εὐκόλως. Ἀντοχή εἰς τὴν φυλλοξήραν ἱκανοποιητική. Ἐχει ἐπιτυχίαν εἰς τὸν ἐμβολιασμόν. Προσαρμόζεται εἰς ξηρὰ ἀσβεστοῦχα ἐδάφη, μὲ τὴν Κορινθιακὴν σταφίδα δὲν ἔχει συγγένεια. Τὸν 4ον χρόνον τὸ ἐμβόλιον ξηραίνεται.

VII. ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩΠΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ

1. 1.37 Pirovano : Ἐπετεύχθη ὑπὸ τοῦ Pirovano διὰ διασταυρώσεως τοῦ Castel 15.612 X Rupestris du Lot. Ὑποκείμενον ὀλίγον θαμνώδες. Εὐρωστία ἀξιοσημείωτος. Ὁρίμανσις τοῦ ξύλου ἀρκετὰ καλή. Ἀντοχή εἰς τὴν φυλλοξήραν ἱκανοποιητική, ὑποφέρει ὀλίγον, εἰς ἔτη ὑγρὰ, ἐκ τοῦ περνοσπόρου καὶ τῆς ἀνθρακώσεως. Ριζοβολεῖ εὐκόλως προσοικεῖται εἰς ἐδάφη ξηρὰ μέσης περιεκτικότητος εἰς CaCo 3.

2. 1043 Paulsen : Ἐπετεύχθη ὑπὸ τοῦ Paulsen εἰς τὸ Παλέρμο διὰ διασταυρώσεως τοῦ Berlandieri No 2 X (Aramon X Rupestris Ganzin No 1). Ὑποκείμενον θαμνώδες. Εὐρωστία μετρία. Ὁρίμανσις τοῦ ξύλου καλή. Ἀντοχή εἰς τὴν φυλλοξήραν περιωρισμένη εἰς τὰς κρυπογαμικὰς ἀσθενείας καλή. Ριζοβολεῖ εὐκόλως, ἀλλὰ δὲν παρουσιάζει ἱκανοποιητικὴν συμβίωσιν μὲ τὰ ἐμβόλια. Λόγω τῶν ἀνωτέρω λόγων δὲν ἔχει διαδοθῆ.

3. 1045 Paulsen : Ἐπετεύχθη ὑπὸ τοῦ Paulsen τὸ 1895 διὰ διασταυρώσεως τοῦ Berlandieri Resseguier No 2 X (Aramon X Rupestris Ganzin No 1). Ὑποκείμενον ἀναρριχόμενον. Εὐρωστον. Ὁρίμανσις τοῦ ξύλου καλή. Ἀντέχει εἰς τὴν φυλλοξήραν καὶ τὰς κρυπογαμικὰς ἀσθενείας. Ριζοβολεῖ εὐκόλως καὶ ἐμφανίζει καλὴν συμβίωσιν μὲ τὸ ἐμβόλιον. Προσοικεῖται εἰς ἐδάφη μέσης συνεκτικότητος, πυριτοαργιλλώδη, μέσης περιεκτικότητος εἰς ἀσβέστιον.