

**ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΛΑΙΑΣ Η ΝΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ;**

# **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΙΣ ΑΝ. ΣΙΚΕΛΙΑΝ**

**Μετάφρασις ἐκ τοῦ «NOTIZIARIO SULLE MALATTIE DELLE PIANTE»  
ὑπὸ κ. ΣΠΥΡΟΥ Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ, γεωπόνου Α. Σ. Ο.**

Τὰ δύο τελευαῖα ἔτη, ἐπ' εὐκαιρίᾳ γενομένης ἐρεύνης ἐπὶ τοῦ μολυσματικοῦ ἐκφυλισμοῦ εἰς τοὺς ἀμπελῶνας τῆς περιοχῆς τῆς Αἴτνης, παρετηρήθη ἐπὶ πολυαριθμών φυτῶν διτὶ ταῦθα ἐνεφανίζον, ἐκτὸς τῶν συμπτωμάτων τοῦ μολυσματικοῦ ἐκφυλισμοῦ, ἔντονον χλώρωσιν ποικιλλουσαν, πάρα πολύ, ὡς πρὸς τὴν ἔντασιν καὶ διάχυσιν ἐπὶ τοῦ φυτοῦ.

Ἐπὶ τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ κ. Ἀντωνίου Σιάκα, κειμένου εἰς τὴν θέσιν «VALLE CORVO» τῆς κοινότητος τῆς Αἴτνης, ἡ χλώρωσις ἐνεφανίζετο εἰς ποσοστὸν 20—30 %, τὰ δὲ προσβεβλημένα φυτὰ ἡσαν τῆς ποικιλίας «NERELLO MASCALESE» διαφόρου ἡλικίας (3, 10 & 40 ἑτῶν).

Αἱ χλωρώσεις αὗται ἀπέδοθησαν

γενικῶς ὑπὸ τῶν ἀμπελουργῶν εἰς τὴν ἔλλειψιν σιδήρου, μολονότι δὲν ἐπετεύχθη ἡ ἔξαλειψις τούτων διὰ τῆς χορηγήσεως εἰς τὰ πάσχοντα φυτὰ σιδήρου εἰτε διὰ τοῦ ἐδάφους εἴτε διὰ τῆς κόμης.

Ἐρευνα γενομένη εἰς ἄλλας ἀμπελουργικάς ζώνας τῆς Ἐπαρχίας τῆς Κατάνιας καὶ εἰς τὰς Συρακούσας πρὸς διαπίστωσιν τοιούτων χλωρωτικῶν φαινομένων ὑπῆρξε θετική, ἀλλὰ εἰς μικροτέραν κλίμακα.

Τὸ φαινόμεμον τοῦτο προεκάλεσε τὴν προσοχὴν τῶν ἐρευνητῶν, διότι ἀφ' ἐνδός μὲν ἡ ἐκδήλωσίς του ἦτο σαφῶς προοδευτική, ὡς ἐβεβαιοῦντο ὑπὸ τῶν παραγωγῶν, ἀφ' ἐτέρου δὲ δὲν ἔξαλειφετο διὰ τῆς χορηγήσεως σιδήρου.

## **Συμπτωματολογία τῆς ἀσθενείας**

Ἡ χλώρωσις ἐμφανίζεται εἰς τὰ φύλλα, τοὺς νεαροὺς βλαστοὺς καὶ εἰς τοὺς βότρεις, ἀτινα ἀποκτοῦν τελικῶς ἔνα χρώμα δμοιόδορφον κίτρινον—κίτρινον βαθύ.

Τὰ φύλλα ἀσθενούσης ἀμπέλου δυνατὸν νὰ ἐμφανίζωνται κανονικῶς πράσινα ἢ πλήρως χλωρωτικά, μεταξὺ δὲ ἀντῶν τῶν δύο σταδίων ὑπάρχουν δλαι αἱ ἐνδιάμεσοι περιπτώσεις. Πράγματι, παρατηροῦνται φύλ-

λα κανονικῶς πράσινα μὲ μικράς κιτρίνας κηλίδας κατὰ μῆκος τῆς κεντρικῆς νευρώσεως καὶ ἀντιστρόφως φύλλα χλωρωτικά μὲ μικράς πρασίνας κηλίδας κατὰ μῆκος τῆς κυρίας νευρώσεως καὶ ἐνίστε διεσπαρμένας ἀνωμαλίας ἐφ' ὅλης τῆς ἐπιφανείας ἢ τημηάτων αὐτῆς. Ἡ πολλάκις ἐμφανίζονται φύλλα κίτρινα μὲ ἔνα μόνον λοβὸν πράσινον.

Ἡ περισσότερον συνήθης μορφὴ