

ἔδωσαν τ' ἀκόλουθα ἀποτελέσματα :

ΔΟΚΙΜΗ Α΄. (Ἐπιζήσαντα μοσχεύματα 23 ἔξ ὧν 7 τοῦ μάρτυρος). Ἐπί μερικῶν φύλλων τεσσάρων μολυνθέντων παρατηρήθησαν ἐλαφραὶ χλωρώσεις τῶν νεύρων ὡς καὶ κάποια περινευρική ζώνη κιτρίνη. Τὰ συμπτώματα ταῦτα συνωδεύοντο πάντοτε ἔξ ἐκείνων τοῦ μολυσματικοῦ ἐκφυλισμοῦ. Ὁ μάρτυς παρέμεινεν ὑγιής.

ΔΟΚΙΜΗ Β΄. (Ἐπιζήσαντα μοσχεύματα 19 ἔξ ὧν 5 τοῦ μάρτυρος). Εἰς μερικά φύλλα 8 μοσχευμάτων ἐνεφανίσθησαν τὰ τυπικὰ συμπτώματα τῆς χλωρώσεως, ὡς αὕτη συναντᾶται εἰς τοὺς ἀμπελώνας, μὲ περινευρικήν ὄσιν κιτρίνην, καλῶς διαφαινομένην καὶ μὲ συχνότητα μεγαλυτέραν τῆς Δοκιμῆς Α΄. Ἐφ' ὅλων αὐτῶν τῶν μοσχευμάτων παρατηρήθησαν συμπτώματα τοῦ μολυσματικοῦ ἐκφυλισμοῦ. Τὰ μοσχεύματα τοῦ μάρτυρος παρέμειναν ὑγιή.

ΔΟΚΙΜΗ Γ΄. (Ἐπιζήσαντα μοσχεύματα 10, ἔξ ὧν 2 τοῦ μάρτυρος). Μόνον ἐπ' ὀλίγων φύλλων δύο μοσχευμάτων παρατηρήθησαν τὰ χαρακτηριστικὰ συμπτώματα τῆς συναντωμένης εἰς τοὺς ἀμπελώνας χλωρώσεως. Καὶ ἐπὶ τῶν δύο μοσχευμάτων παρατηρήθησαν συμπτώματα μολυσματικοῦ ἐκφυλισμοῦ. Τὰ τοῦ μάρτυρος παρέμειναν τελείως ὑγιή.

ΔΟΚΙΜΗ Δ΄. (Ἐπιζήσαντα μοσχεύματα 11 ἔξ ὧν 3 τοῦ μάρτυρος). Ἐπ' αὐτῶν παρατηρήθησαν ἐλαφρῶς τὰ συμπτώματα ἀσθeneίας. Ἐπί τριῶν ἔξ αὐτῶν παρατηρήθησαν τὰ συμπτώματα μολυσματικοῦ ἐκφυλισμοῦ. Τὰ φύλλα τῶν ἀναπτυχθέντων δύο βλαστῶν ἐκ τοῦ ὑποκειμένου ἐφαίνοντο κανονικά. Ὁ μάρτυς ἐνεφάνιζε βλάστησιν τελείως κανονικήν.

ΔΟΚΙΜΗ Ε΄. (Ἐπιζήσαντα μοσχεύματα 25 ἔξ ὧν 6 τοῦ μάρτυρος). Ἄπαντες οἱ βλαστοὶ οἱ ἀναπτυχθέντες ἀπὸ τὸ ἀσθενὲς ἐμβόλιον τῆς

«NERELLO MASCALESE» ἐνεφάνιζον τὰ τυπικὰ συμπτώματα τῆς ἀσθeneίας. Μόνον εἰς τρία μοσχεύματα οἱ ἀναπτυχθέντες ἐκ τοῦ ὑποκειμένου βλαστοὶ ἐνεφάνιζαν τὰ συμπτώματα τῆς ἀσθeneίας πολὺ ἥπια, ἐνῶ ὅλοι οἱ ἄλλοι ἦσαν κανονικοί. Ὁ μάρτυς ἔδωσε βλαστοὺς πλήρως ὑγιεῖς.

ΔΟΚΙΜΗ ΣΤ΄. (Ἐπιζήσαντα μοσχεύματα 4 ἔξ ὧν 1 τοῦ μάρτυρος). Ἐπὶ 3 μολυνθέντων μοσχευμάτων ἀνεπτύχθησαν μόνον μερικοὶ βλαστοὶ τοῦ ὑποκειμένου ἀφοῦ μετὰ τὴν ἔναρξιν τῆς βλαστήσεως ἀπεχωρίσθησαν τὰ ἐμβόλια. Ἐφ' ἑνὸς ἔξ αὐτῶν μερικὰ φύλλα ἐνεφάνιζον συμπτώματα πολὺ ἥπια, συνοδευόμενα ἀπὸ ἐλαφρὰ συμπτώματα τοῦ μολυσματικοῦ ἐκφυλισμοῦ.

ΔΟΚΙΜΗ Ζ΄. Τὰ μοσχεύματα τῆς δοκιμῆς αὐτῆς μετὰ τὴν βλάστησιν ἀπεξηράνθησαν.

Μία ἀξιολόγησις τῶν ἀποτελεσμάτων, πραγματοποιηθεῖσα τὸν Ἰούλιον τοῦ ἰδίου ἔτους, εἰδείξεν ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν μοσχευμάτων τῶν ἐκδηλωσάντων τὰ σημεῖα τῆς μεταδόσεως τῆς ἀσθeneίας, δι' ἐκάστην δοκιμήν, ἦτο ὁ αὐτὸς μὲ ἐκείνων τῆς πρὸ δύο μηνῶν γενομένης παρατηρήσεως.

Τὴν ἄνοιξιν πολλὰ τῶν φύλλων, φέροντα τὰ σημεῖα τῆς ἀσθeneίας περισσότερο ἢ ὀλιγότερον εὐκρινῆ, ἐπαρουσίαζον τὴν ἐπιφανείαν τῶν ἐν μέρει ἢ ἐν ὅλῳ κιτρίνην ἢ μὲ φαρδείας ὄψεις χρώματος λευκοῦ—κρέμ συχνὰ στικτὴ μὲ κηλίδας χρώματος πρασίνου ὠχροῦ, εἰδικῶς εἰς τὰς περινευρικὰς ζώνας. Ἐπὶ μερικῶν φύλλων παρατηρήθησαν νεκρωτικαὶ κηλίδες κατὰ μήκος τῶν χηλῶν τῆς ἐπιφανείας.

Τὰ προαναφερθέντα συμπτώματα τῆς ἀσθeneίας συνωδεύοντο πάντοτε ἀπὸ τὰ τυπικὰ συμπτώματα τοῦ μο-