

Α/Α Κεφα- λών ενός πρέμιου	Μήκος πρώτων βλαστών (πρωτο- λατών εις CM.		'Επιδεκτικά μο- λύνσεως πέραν της σταφυλής φύλλα πρώτων βλαστών		Μήκος δευτέρων βλαστών εις CM.		'Επιδεκτικά μο- λύνσεως πέραν της σταφυλής φύλλα δευτέρων βλαστών	
	30/4/64	10/5/64	30/4/64	11/5/64	30/4/64	11/5/64	30/4/64	11/5/64
1	40	65	3	5	25	45	1	3
2	50	80	2	4	40	68	2	3
3	45	70	2	5	37	55	1	4
4	28	45	2	3	25	45	2	3
5	35	55	1	3	28	43	2	4
6	55	83	2	5	28	45	0	2
7	45	75	1	4	25	40	0	2
8	32	60	0	3	28	45	0	3

Αί σταφυλαί εύρισκονται εις τόν 4ον και 5ον κόμβον (ο πρώτος κόμβος φέρει τό πρώτο μικρό φύλλο της βάσεως του βλαστού) τά δε φύλλα των κόμβων της άνω σταφυλής δέν ύπολογίζονται εις τόν άνωτέρω πίνακα.

Τό φύλλον θεωρείται επιδεκτικόν μολύνσεως όταν είναι μεγαλύτερο των 6—8 CM² ήτοι μεγαλύτερο ταλήρου και εμφανίζεται τό φύλλον τούτο εις νεαράν βλάστησιν μήκους 8—10 CM.

Κατόπιν των άνωτέρω άπεφασίσθη όπως ο πρώτος ψεκασμός γίνη πρίν κελυφθοῦν ὑπό των φύλλων αί ταξιανθιαί ήτοι τήν 5—5—64 ή δε θείωσις τήν 9—5—64.

Ο δεύτερος ψεκασμός έπρεπε νά γίνη πρίν της άνθήσεως, δεδομένου δε ότι ή άνθησις ήρχισε πραγματικώς τήν 19—5—

64 (έκτός ελαχίστων άνθών τά όποια άπεκαλύφθησαν τήν 16—5—64), τό διάστημα 15—19—5—64 ήτο κατάλληλον.

'Εν τούτοις όμως έπειδή τοπικώς (έντός του κήματος) αί βροχοπτώσεις 'Απριλίου—Μαΐου (πίναξ I) ήσαν άνικανοί όπως ύποβοηθήσουν τάς πρωταρχικάς μολύνσεις άνεβάλαμεν τόν δεύτερον ψεκασμόν πρός άπόδειξιν της αναγκαιότητος ή μη τούτου και τόν έπραγματοποιήσαμεν τήν 26—5—64, τήν δε θείωσιν τήν 27—5—94.

Ο τρίτος ψεκασμός εγένετο τήν 10—6—64 και ή θείωσις (D.D.T.) τήν 16—6—64.

Παρατηρούντες τά δεδομένα του πίνακος I βλέπομεν νά έμφανίζονται αί πρώται κηλίδες τήν 19—5—64, ενώ αί μέχρι

ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ!

**Μόνον ή καλή ποιότητα
της σταφίδος μπορεί νά
συναγωνισθῆ αποτελεσματικά
τις ξένες σταφίδες.**