

ΕΝΑ ΝΕΟΝ ΑΝΤΙΦΥΛΛΟΞΗΡΙΚΟΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΝ
ΤΟ SO 4, ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΟΝ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ,
ΕΙΣΗΧΘΗ ΑΠΟ ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ ΠΑΡ' ΗΜΙΝ

Διεξάγονται πειράματα εἰς τὴν Ἀττικὴν. — Θὰ προσφέρῃ σημαντικὰς ὑπηρεσίας εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Ἀμπελοργίαν

Ὑπὸ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ, γεωπόνου-προϊσταμένου
τοῦ Γραφείου Ἀμπελοργίας Νομοῦ Κορινθίας

Ἐνα νέον ἀντιφυλλοξηρικόν ὑποκείμενον εἰσήχθη τὸ ἔτος 1941 ἐν Γαλλίᾳ.

Ἐδημιουργήθη εἰς τὴν Ἀμπελοργικὴν Σχολὴν τοῦ OPPENCHEIM ἐν Γερμανίᾳ ἀποτελεῖ δὲ ἐπιλογὴν τοῦ TELEKI No 4 ἐξ αὐτοῦ δὲ καὶ τῆς Ἀμπελοργικῆς Σχολῆς τοῦ OPPENCHEIM ἔλαβεν καὶ τὸ ὄνομά του SO 4 (SELECTION OPPENCHEIM No 4).

—Περιγραφή

Ἐχει βλάστησιν γενικῶς χνοώδη, λευκὴν μὲ παρυφὴν ροδίνην. Τὰ νεαρὰ φύλλα εἶναι ἀραχνοειδῆ, πράσινα ἕως χαλκοπράσινα. Τὰ ὄριμα φύλλα εἶναι σφηνοειδῆ, ἀμαυρά, ὑποκίτρινα, κυματοειδῆ. Ὁ μισχικός κόλπος εἰς τὰ νεαρὰ φύλλα εἶναι σχήματος (V), μετασχηματιζόμενος βραδύτερον εἰς τὰ ὄριμα τοιαῦτα εἰς U ἀνοικτόν. Οἱ κόμβοι τῶν βλαστῶν ἔχουν ἰώδη ἀπόχρωσιν.

—Ἰδιότητες

Τὸ SO 4 θεωρεῖται ἐν Γαλλίᾳ ὡς ἐν τῶν καλλιτέρων ὑποκειμένων καὶ

ὡς ἐκ τούτου ἐπεκτείνεται ἡ φύτευσις του μὲ γοργὸν ρυθμόν.

Αἱ μητρικαὶ φυτεῖαι αὐτοῦ αὐξάνονται συνεχῶς διὰ τὰ δύνηθον οἱ φυτωριοῦχοι τὰ ἀναποκριθῶν εἰς τὰς ἀνάγκας τῶν Γάλλων ἀμπελοργῶν οἱ ὅποιοι ἐκτιμοῦν τὸ ὑποκείμενον τοῦτο καὶ τὸ προτιμοῦν ἐναντὶ τῶν ἄλλων ὑποκειμένων.

Εἰς τὰς μητρικὰς φυτεῖας δίδει ἄφθονον, ὄριμον καὶ γενικῶς ἐξαιρετικῆς ποιότητος ξύλον, τὸ ὅποιον ὀριμάζει ἐνωρίτερον τῶν ἄλλων TELEKI.

Ἡ ριζοβολία του θεωρεῖται εὐκολος, ἔχει δὲ ἐπιτυχίαν ριζοβολίας, εἰς τὸ φυτώριον, ποικίλλουσαν, ἀπὸ 66 ἕως 88 %.

Ἡ ἐπιτυχία του κατὰ τὸν ἐπιτόπιον ἐμβολιασμόν εἶναι ἐξαιρετικὴ, ἀνερχομένη εἰς 95 % περίπου, εἰς δὲ τὸν ἐπιτραπέζιον, πρὸς παραγωγὴν ἔρριζων ἐμβολιασμένων, εἶναι ἀρκετὰ ἱκανοποιητικὴ.

Προσδίδει μεγάλην ἀνάπτυξιν καὶ ζωηρότητα εἰς τὰς ἐπ' αὐτοῦ ἐμβολιαζομένας ποικιλίας VINIFERA,