

τάς ὁποίας ὠνομάσαμεν δακοποτίστρας.

Τέλος αἱ δακοσυλλήψεις εἰς τὸ παραλιακὸν συνεργεῖον Περουλάδων (μεγάλην ἐστίαν δάκου) ἀπὸ τὰς ἀρχὰς Αὐγούστου, χάρις εἰς τὰ ληφθέντα μέτρα, ἔχουσιν ἐκμηδενισθῆ, τὸ ποσοστὸν δὲ τῆς δακοπροσβολῆς εἰς τὸ τέλος τῶν διαβροχῶν (Δεκέμβριον) ὑπῆρξε μηδαμινόν, ὑπολογιζόμενον εἰς χιλιοστὰ μόνον. Κατ' ἐντολήν μας, ἀρχὰς Αὐγούστου, ἐγένετο καὶ τὸ μᾶδημα ἐλαιοκάρπου (κορυφαίων κλώνων) ὄλων τῶν πρωϊκάρπων ἐλαίων. Κατὰ τὸ αὐτὸ ἐπίσης εἰχομεν παρατηρήσει ὅτι ἡ μεσόκαρπος ποικιλία ἐλαίας, γνωστὴ ὡς Καλοκαιρίδα προσβάλλεται παρὰ τῶν μητέρων δάκων (ἀρχὰς Ἰουνίου)

κατὰ 20—30 ἡμέρας ἐνωρίτερον ἐξ ὄλων τῶν εἰς Κέρκυραν καλλιεργούμενων ποικιλιῶν καὶ παραλλαγῶν τῆς ἐλαίας.

Κατὰ τὴν γνώμην μας ἡ ὑπαρξὶς μεγάλου ἀριθμοῦ (7% Καλοκαιρίδος), ἀναλόγως διεσπαρμένου παντοῦ εἰς τὰ ἐλαιοστάσια μιᾶς Κοινότητος ἀσφαλῶς ἔχει σημασίαν καὶ πρόκειται, ὡς πιστεύομεν περὶ μιᾶς προτύπου ἐργασίας ἀνωμόμου τινὸς Ἐνετοῦ ἐπιστήμονος, ὅστις εἶχεν ἐπιχειρήσει νὰ θέσῃ εἰς ἐφαρμογὴν τὸ σύστημα παγιδεύσεως μητέρων δάκων (ὡς τοῦτο γίνεται μὲ τὴν μέθοδον μας) ἵνα ἔχῃ ἄριστα ἀποτελέσματα. Ἡ νέα αὕτη μέθοδος ἐθεωρήθῃ ἄκρως ἐπιστημονικὴ, λιαν ἐνδιαφέρουσα καὶ ἐπαναστατικὴ.

Γενικὴ ἀνασκόπησις ἡμετέρας τῆς σταφιδοκαλλιέργειας

Μετεωρολογικὰ Δελτία



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Κατὰ τὸν μῆνα τοῦτον ἐπεκράτησαν γενικῶς ξηρικοὶ συνθήκαι πλὴν τῆς περιοχῆς Φιλιατρῶν ἐνθα τὸ ὕψος τῆς βροχοπτώσεως ἰσοδυναμοῦσε μὲ μίαν καὶ ἡμίσειαν ἄρδουσαν.

Αἱ βροχοπτώσεις τοῦ μηνὸς τούτου ἦσαν μικρότεροι τῶν τοιούτων τοῦ ἀντιστοίχου μηνὸς τοῦ περασμένου ἔτους μόνον εἰς τὸν Νομόν Ἡλείας.

Ἡ ἐνεργὸς ζωὴ τῆς σταφιδαμπέλου περιορίσθη εἰς τὴν ἀποταμίευσιν θρεπτικῶν οὐσιῶν εἰς τὰς ρίζας, τὸν κορμὸν καὶ τοὺς βραχίονας αὐτῆς ἐνῶ, ἐκ παραλλήλου, ἡ φυλλόπτωσης συνεχίσθη.

Αἱ ἐκτελεσθεῖσαι καλλιεργητικαὶ ἐργασίαι κυρίως ἀπεσκόπου εἰς τὸν καθαρισμόν τῶν χανθάκων ἀποστραγγίσεως καὶ εἰς τὴν περιλάκκωσιν τῶν πρέμων τὸσον διὰ τὴν συγκέντρωσιν τῶν ὀμβρίων ὕδατων ὅσον καὶ κυρίως, διὰ τὴν δια-

σκόρπισιν τῶν φωσφοροκαλιούχων λιπασμάτων.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Αἱ κατὰ τὸν ὕπ' ὄσιν μῆνα ἐπικρατήσασαι καιρικοὶ συνθήκαι ἠνύνησαν τὴν ὁμαλὴν ἐξέλιξιν τοῦ ἐτησίου βιολογικοῦ κύκλου τῆς σταφιδαμπέλου ἀπ' ἐνὸς καὶ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐποχιακῶν ἐργασιῶν αὐτῆς ἀπ' ἑτέρου.

Ἡ ἐνεργὸς δραστηριότης τῆς σταφιδαμπέλου περιορίσθη εἰς τὸ ἐλάχιστον, ἡ δὲ φυλλόπτωσης αὐτῆς ἐσυνεχίσθη.

Ἡ ἀρξάμενη ἀπὸ τὸν προηγούμενον μῆνα περιλάκκωσις τῶν πρέμων ἐσυνεχίσθη ἐνῶ ἐκ παραλλήλου ἤρχισεν ἡ ἐφαρμογὴ τῆς φωσφοροκαλιούχου λιπάνσεως καὶ ἡ σπορὰ φυτῶν χλωρᾶς λιπάνσεως. Σποραδικῶς ἤρχισεν ἐπίσης ὑπὸ μερικῶν παραγωγῶν καὶ ὁ κλαδοκάθαρος τῆς σταφιδαμπέλου.

(Ἐκ τοῦ Γεωργικοῦ Τμήματος)