

# ΟΔΗΓΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

# Η ΦΥΤΟΡΜΟΝΗ ΚΑΡΠΟΔΕΣΕΩΣ

# ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΧΑΡΑΓΗΝ

Συνδυασμὸς αὐτῆς μὲ μονοχάρακο ἢ ἀπλὸ διπλοχάρακο φέρει  
καλύτερα ἀποτελέσματα. — Προσοχὴ εἰς τὴν ποσολογίαν

## ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΤΑΦΙΔΟΣ Α. Σ. Ο.

Θέτομεν ὅπ' ὅψιν τῶν σταφιδοπαραγωγῶν τὰ κατωτέρω δεδομένα, ἔξαχθέντα ἐκ τῶν μέχρι σήμερον πειραμάτων τοῦ Σταφιδικοῦ Ἰνστιτούτου, σχετικῶς μὲ τὸ θέμα τῆς ἀντικαταστάσεως τῆς χαραγῆς τῆς σταφιδαμπέλου δι' ὀρμονικῶν οὐσιῶν καὶ συγκεκριμένως διὰ τῆς ὀρμόνης 4—χλωροφαινοξυοξικὸν δξὺν ἢ «ΦΥΤΟΡΜΟΝΗΣ ΚΑΡΠΟΔΕΣΕΩΣ» ὅπως κοινῶς ἀποκαλεῖται τὸ ὑπὸ τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης διατιθέμενον καὶ χρησιμοποιούμενον κυρίως ὑπὸ τῶν τοματοκαλλιεργητῶν ἴδιοσκεύασμα αὐτῆς (ἄλας διαιθανολαμίνης τοῦ 4—χλωροφαινοξυοξικοῦ δξέος): Ἡ Φυτορμόνη Καρποδέσεως δὲν πρέπει ποτὲ νὰ χρησιμοποιεῖται κατά τὸ στάδιον τῆς ἀνθήσεως τῆς σταφιδαμπέλου, διότι δημιουργεῖ γίγαρτα (κουκκούτσια) εἰς τὸν σταφιδόκαρπον, πρᾶγμα ἀπαράδεκτον εἰς τὸ ἐμπόριον τῆς σταφίδος. Ἐπιβάλλεται νὰ χρησιμοποιηται πάντοτε μετὰ τὸ πλήρες δέσιμο τοῦ καρποῦ τῆς σταφυλῆς, δόπτε δὲν ὑπάρχει φόβος ἐμφανίσεως κουκκουτσιῶν στὶς ράγες.

Ἐπειδὴ τὸ δέσιμον τοῦ καρποῦ τῆς σταφυλῆς δλοκληρώνεται συνήθως μέχρι τὴν ἐβδόμην ἡμέραν ἀπὸ

τῆς πλήρους ἀνθήσεως, δι' αὐτὸ ἐθεωρήθη ὡς καταλληλότερος χρόνος ἐφαρμογῆς τῆς φυτορμόνης τὸ χρονικὸν διάστημα μεταξὺ τῆς ἐβδόμης ἥκας δεκάτης ἡμέρας ἀπὸ τῆς πλήρους ἀνθήσεως τῆς σταφυλῆς. Θεωροῦμεν δὲ πλήρη ἄνθησιν τὸ στάδιον αὐτῆς κατὰ τὸ δόπιον ἔχουν ἀνοίξει καὶ πέσει τὰ δύο τρίτα περίπου (70 %) τῶν ἀνθέων.

Χρησιμοποιουμένη ὑπὸ τὴν ἀνωτέρω προϋπόθεσιν ἡ φυτορμόνη δὲν ἐπιδρᾷ στὶς νεαρές αὐτόρριζες ἀχαράκωτες σταφιδοφυτείες ἡλικίας 3—4 ἑτῶν. Ἐπιδρᾶ περιωρισμένα στὶς φυτείες 5—7 ἑτῶν καὶ ἀνάλογα στὶς ἀνώ τῶν 8 ἑτῶν.

Πάντως καὶ ὑπὸ τάς εὐνοϊκωτέρας συνθήκας ἐφαρμογῆς τῆς, ἡ φυτορμόνη καρποδέσεως είναι ἀδύνατον ν' ἀντικαταστήσῃ μόνη τὴν δακτυλιωτὴν χαραγὴν ὑπὸ τὰς Ἑλληνικὰς συνθήκας καλλιεργείας τῆς σταφιδαμπέλου. Πάντοτε ὑπολείπεται αὐτῆς ὡς πρὸς τὴν κατὰ στρέμμα παραγωγὴν σὲ ξηρὸν σταφιδόκαρπον.

Ἄλλα καὶ ἐν συνδυασμῷ μὲ κορυφολόγημα τῶν καρποφόρων βλαστῶν ἐφαρμοζομένη αὕτη δὲν δίδει σταθερὰ ἀποτελέσματα (κορυφολό-