

ματα τῆς ἀναμπελώσεως, ἴητο τὸ τῶν ἐμβολιασμένων μοσχευμάτων.

3) Ἐπὶ τῶν λιπάνσεων: Ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε δεδομένων φαίνεται ὅτι μόνον ἡ ἀζωτοῦχος λίπανσις ἀντιδρᾷ ἐπὶ τῆς αὐξήσεως τῆς παραγωγῆς ὡς καὶ ἡ χλωρὰ τοιαύτη καὶ μάλιστα εἰς βαθμὸν μεγαλύτερον τῆς ἀζωτοῦχου. Ἡ κάλυψις τῆς χορτομάζης — εἰς τὰς χλωρὰς λιπάνσεις — δέον νὰ γίνεται ἀναλόγως, βεβαίως, τῶν κλιματολογικῶν συνθηκῶν, ἀλλὰ πάντοτε ἐντὸς τοῦ Μαρτίου. Τὰ συνιστάμενα φυτὰ κατὰ περιοχὴν εἶναι ὁ βίκος, ὅπου δὲν ὑπάρχουν πτηνά, τὰ ἀγριολοῦπινα, ὅπου ἡ περιεκτικότης τοῦ ἔδαφους εἰς ἀσφῆστιον τὸ ἐπιτρέπει, καὶ τὰ φούλια ὅπου ὑπάρχουν πτηνά. Ἡ σπορὰ τῶν φυτῶν νὰ γίνεται δσον τὸ δυνατόν προαίματον. Ἄλλὰ παρετηρήθη ὅτι ἡ ταχεῖα ἀνάπτυξις αὐτῶν τελεῖται τὸν Μάρτιον. Τὰ ἔδαφη ἔχουν ἀνάγκη ὀργανικῆς οὐσίας (χουμάδος), ἣτις πρέπει νὰ προστίθεται εἰς τὸ ἔδαφος διὰ τὴν αὐξησιν τῆς παραγωγῆς.

4) Ἐπὶ τῆς κλωνικῆς ἐπιλογῆς: Καὶ κατὰ τὴν ἐφετεινὴν περίοδον (Αὐγούστος 1965) ἡ μελετωμένη ἐν τῷ Ἰνστιτούτῳ Σταφίδος παραλλαγὴ σταφιδαμπέλου ἔδωσε τὰ αὐτὰ ἀποτελέσματα, ἴητο καρπὸν ἰσόκλωνον βαθύκλωνον πρῶτον μετὰ μεγάλην περιεκτικότητα σακχάρου.

Ἡ παραλλαγή αὕτη πολλαπλασιάζεται ὅπως ἀποσταλῆ πρὸς παρακολούθησιν καὶ εἰς τὰ ὑπόλοιπα σταφιδικὰ διαμερίσματα, ἵνα ἴδωμεν ἐὰν εἰς τὰ διάφορα ὀκλογικὰ περιβάλλοντα διατηρῆ σταθεροὺς τοὺς χαρακτήρας τῆς. Ἡ ἀπόκτησις κλώνων μετὰ λίαν ἐπιθυμητοὺς χαρακτήρας εἶναι ἔργον τῆς ἐρεύνης. Κατὰ τὸ τρέχον ἔτος θὰ ἐνταθῆ ἡ ἐρευνα διὰ τὴν ἀνεύρεσιν νέων κλώνων.

5) Ἐπὶ τῆς μαζικῆς ἐπιλογῆς: Ἡ μαζικὴ ἐπιλογή εἶναι λίαν ἀπαραίτητος διὰ τὴν ἴδρυσιν ἀμπελώνων ἐμβολιοληψίας. Ἐμβόλια ὑγιῆ καὶ παραγωγικὰ θὰ δημιουργήσουν ὀκονομικοὺς καὶ ὀμοιομόρφους

ἀμπελώνας. Κρίνεται ἀναγκαῖα ἡ ἐκπαίδευσις τῶν παραγωγῶν ἐπὶ θεμάτων ἐπιλογῆς ἐμβολίων. Καλὸν θὰ ἴητο ἡ ἴδρυσις μητρικῶν φυτειῶν ἐμβολιοληψίας, ἀλλὰ αὐτὴ δὲν θὰ δυνηθῶν νὰ ἐξυμνηρῆσθουν ὄλας τὰς ἀπαιτήσεις. Διεπιστώθη ἡ ἔλλειψις προσωπικοῦ τῶν Διευθύνσεων Γεωργίας καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ διενέργεια μαζικῆς ἐπιλογῆς εἰς εὐρεῖαν κλίμακα. Τὸ Ἰνστιτούτον Σταφίδος πέραν τῶν ἴδη ὑφισταμένων σταφιδαμπελώνων μαζικῆς ἐπιλογῆς θὰ διενεργῆσῃ μαζικὴν ἐπιλογὴν εἰς τὰς σταφιδοφυτείας τῶν κτημάτων του καὶ εἰς τοὺς πειραματικοὺς προσαρμογῆς καὶ συγγενείας ὡς καὶ εἰς τοὺς ἀποδεικτικοὺς τοιούτους.

6) Ἐπὶ τῶν λιπάνσεων τῶν μητρικῶν φυτειῶν: Βάσει τῶν μέχρι σήμερον πειραματικῶν δεδομένων φαίνεται ὅτι αἱ μητρικαὶ φυτεῖαι δὲν ἀντιδρῶν εἰς τὴν λίπανσιν τοῦλάχιστον διὰ τὸ κτήμα Χανακίων. Τὰ πειράματα θὰ συνεχισθοῦν.

7) Ἐπὶ τῆς καταπολεμήσεως τῶν ζιζανίων τῶν μητρικῶν φυτειῶν: Εἶναι δυνατὴ ἡ καταπολέμησις τῶν ζιζανίων τῶν μητρικῶν φυτειῶν διὰ τῆς χρήσεως «Νταουπόν», ἀλλὰ προκαλοῦνται σοβαρὰ ἐγκαύματα εἰς τὴν ἔρπουσαν θλάσθησιν. Ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων ὁμως ἀποδεικνύεται ὅτι καθίσταται ἐφικτὴ ἡ καταπολέμησις τῶν ζιζανίων εἰς τὴν σταφιδάμπελον χωρὶς ἐγκαύματα, διότι δὲν ἔχει θλάσθησιν ἔρπουσαν. Θὰ συνεχισθοῦν τὰ πειράματα μετὰ προφυτρωτικά καὶ μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα ὡς καὶ μετὰ μίγματα αὐτῶν.

8) Ἐπὶ τῆς ἐμβαπτίσεως τῶν μοσχευμάτων εἰς ὕδωρ: Ἐκ τοῦ διενεργηθέντος πειράματος ἀπεδείχθη ὅτι ἡ ἐμβαπτίσις τῶν μοσχευμάτων εἰς ὕδωρ ἐπὶ 60 ὥρας αὐξάνει τὸ ποσοστὸν ριζοβολίας. Τὸ πείραμα θὰ ἐπαναληφθῆ.

9) Ἐπὶ τῆς χρησιμοποίησεως τῆς ὀρμόνης «SERADIX» διὰ τὴν αὐξησιν τῆς ριζογενέσεως: Ἡ ὀρμόνη αὕτη δὲν ἔδωσεν ἰκανοποιητικά ἀποτελέσματα.

ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ !

Μόνον ἡ καλὴ ποιότητα τῆς Σταφίδος θὰ αὐξήσῃ τὸ εἰσὸδμά σας.