

Natural Thompson Seedless Raisins Καλι-φορνία: Διὰ παράδοσιν τοῦ ἐμπορεύματος ἐκ τῆς προκυμαίας £ 144 κατ' Ἀγγλικόν τόννον. Ὁ αὐτὸς τύπος σταφίδος Νοτίου Ἀφρικῆς προσεφέρετο μὲ τοὺς αὐτοὺς ὄρους εἰς £ 143 ¹⁰/₋ καὶ τοῦ Ἀφγανιστάν £ 127 ¹⁰/₋.

Γενικὴ ἀνασκόπησις ἡ
τῆς σταφιδοκαλλιέργειας

Μετεωρολογικὰ Δελτία



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Κατὰ τὸν ἐν λόγῳ μῆνα ὠλοκληρώθη ὁ τρυγητὸς καὶ ἡ ἀποξήρανσις τοῦ σταφιδοκάβρου.

Αἱ ἐπικρατήσασαι καιρικαὶ συνθήκαι μᾶλλον εὐνοϊκαὶ ἤμωρεὶ νὰ χαρακτηρισθοῦν διὰ τὴν ἀποξήρανσιν αὐτοῦ. Ὁ ἀποληφθεὶς ὁμως ξηρὸς σταφιδόκαρπος ὕστερεὶ ποιοτικῶς ἔνεκα τῶν δροσερῶν καιρικῶν συνθηκῶν τοῦ προηγουμένου μηνὸς (ρήξεις ραγῶν, σήψεις σταφυλῶν, ὑπέρμετρος αὔξησις μεγέθους ραγῶν).

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Κατὰ τὸν Ὀκτώβριον ἐπεκράτησαν συνθήκαι μᾶλλον ὕγραι καὶ αἱ βροχοπτώσεις τοῦ μηνὸς ἀνῆλθον εἰς 71,5 mm ἐναντι 25 mm τοῦ ἀντιστοίχου μηνὸς τοῦ παρελθόντος ἔτους 1965.

Ἡ φυλλόπτωσης ἀρχίσασα ἀπὸ τὸν παρελθόντα μῆνα Σεπτέμβριον, ἐσυνεχίσθη καὶ κατὰ τὸν Ὀκτώβριον.

Ἔργασια αἱ ὁποῖαι ἐγένοντο εἰς τὰς σταφιδαμπέλους κατὰ τὸν Ὀκτώβριον ἦσαν κυρίως ὁ καθαρισμὸς καὶ ἐκβάθυνσις ἀποστραγγιστικῶν χανδάκων καὶ εἰς τινὰς περιοχὰς ἡ περιλάκκωσις (ξελάκκωμα) διὰ τὴν λίπανσιν τῶν σταφιδαμπέλων.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Κατὰ τὸν Νοέμβριον ἐπεκράτησαν συνθήκαι ἐξόχως ὕγραι λόγῳ καὶ τῶν μεγάλων βροχοπτώσεων. Τὸ ὕψος βροχῆς κατὰ τὸν ἐν λόγῳ μῆνα ἀνῆλθεν εἰς 235,5 mm ἐναντι 84,5 mm τοῦ Νοεμβρίου 1965.

Ἡ φυλλόπτωσης τῶν σταφιδαμπέλων ἐσυνεχίσθη. Καλλιεργητικαὶ ἐργασιαὶ ἐγένοντο εἰς περιορισμένην κλίμακα, συνίσταντο δὲ αὐταὶ εἰς τὴν περιλάκκωσιν καὶ μερικῶς εἰς λίπανσιν τῶν σταφιδαμπέλων.

(Ἐκ τοῦ Γεωργικοῦ Τμήματος ΑΣΟ)